

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas, utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

Evitar el contacto con los ojos ya que causa irritación moderada.

Evitar la inhalación y contacto con la piel.

Después de la aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

No almacene este producto en casas de habitación.

Conserve **Supercur 250 EW**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Grupo Químico:** Triazoles

**En caso de ingestión:** Si la ingesta fue accidental y la persona está conciente dar a beber dos vasos de agua. Nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconciente. Asistencia médica inmediata.

**En caso de inhalación:** Remover a la persona afectada al aire libre y si la respiración es dificultosa llamar al médico.

**En caso de contacto con la piel:** Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

**En caso de contacto ocular:** Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, Manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).

**Síntomas de intoxicación:** dolor abdominal, náuseas, gastritis, dificultad respiratoria, diarrea.

**Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.**

**EMERGENCIAS:** Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 . CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 4118000 opción 4

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Supercur® 250 EW

**FUNGICIDA AGRICOLA**

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

#### COMPOSICION QUIMICA:

Tebuconazole..... 250 g / L

Aditivos .....c.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 385 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y  
Distribuidor:

FORMULADO POR:

SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL  
COMPANY LIMITED

Hangzhou Economic and Technological Development Zone,  
Hangzhou, Zhejiang - CHINA

CAPEAGRO S.A.C.

Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E  
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido

Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

##### Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Supercur 250 EW**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.25	0.5	30	0.05
	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2	0.5	7	0.01
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.06-0.07	--	21	6

\*PC: Periodo de Carencia

\*\* LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación .

#### COMPATIBILIDAD:

En general se aplica solo. Se recomienda no mezclar con concentrados emulsionables, ya que puede haber fitotoxicidad .

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

