

21.5

Tank

FUNGICIDA DE USO AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cymoxanil.....80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos..... csp 1Kg

REG. PQUA N° 400 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW
CHEMICAL CO., LTD.
6 th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center,
Shunhua Road 750 #,
Jinan, Shandong, China.

Importado y Distribuido por:
SOC. AN. *Fausto Piaggio*

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú.
Teléfono: 464-2222 Fax: 464-2211
E-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



CONTENIDO NETO: 1 Kilo

Lote N°
F. Formulación:
F. Vencimiento:

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

36 cm

21.5

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con agua abundante y jabón. En caso de ingestión no provocar el vómito; avisar a un médico. En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe practicar respiración artificial.

Nota al médico: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:

CICOTOX:0800-13040 / 328-7398

INFOSALUD: 0800-10828

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

VACIOS: Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.

Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.

No permitir el ingreso de animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlos en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

GENERALIDADES:

TANK es un fungicida curativo – preventivo a base de cymoxanil y mancozeb, los cuales pertenecen a los grupos químicos: cianoacetamidas-oximas y dithiocarbamatos, respectivamente.

TANK tiene acción sistémica y de contacto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

Agregue **TANK** según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente **TANK** en un balde con agua, mezclar hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

Soc. An. Fausto Piaggio garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE DOSIS Y USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil 200L		
Tomate	Hielo fungoso o ranchara	<i>Phytophthora infestans</i>	-	0.5 - 0.75	8	0.05
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2 - 2.5	-	28	0.2* 5**

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

Cymoxanil*

Mancozeb**

