

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Causa ligera irritación a la piel. Evitar el contacto del producto a la ropa o piel.
 - Causa irritación moderada a los ojos.
 - Tóxico por ingestión.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
 - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
 - No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos o bebidas.

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASE VACÍOS:**
- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego triturado, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase, triple lavado al centro de acopio autorizado.

- PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo Químico: Triazol
 - En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco; aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado y trasladar al paciente al médico.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y llevar al paciente al médico.
 - En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300
ESSALUD EN LÍNEA: 0801-92200

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, nor, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - No aplicar el producto en zonas con aguas fértiles superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRICOLA
Concentrado Emulsionable (EC)

Composición Química:
Hexaconazole 100 g/L
Aditivos c.s.p. l/L

Registro PQUA N° 412-SENASA



Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA
Teléfono: +86-25-52782915

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Contenido Neto: **500 ml**

N° Lote:
F. Form:
F. Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

S-PRONTO®100EC, es un fungicida triazol, sistémico con acción curativa y preventiva; empleado en el control de hongos. Presenta un movimiento sistémico ascendente a través del xilema de las plantas conjuntamente con el agua y los elementos minerales absorbidos.

S-PRONTO®100 EC, es utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades en cultivos como espiérnago.

S-PRONTO®100 EC, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, provocando un crecimiento fungal anormal y posteriormente la muerte.

S-PRONTO®100EC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar la cantidad de agua.

S-PRONTO®100 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (g/ha)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/CI 200 L		
ESPARRAGO	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.75	250	14	0.02
	"Odirosis"	<i>Uncinula necator</i>	0.5	-	7	0.1
PIMENTO	"Odirosis"	<i>Leveillula taurica</i>	-	200	7	0.01

LMR: Límite Máximo Residuos

PC: Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
En espiérnago se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar ante los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con pesticidas de uso común, excepto aquellos que son de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

