

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN:

- Causa fuerte irritación a la piel. Evitar el contacto del producto a la ropa o piel.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Evitar que el niño este jugando, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o otros.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en recipientes originales y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y absorción.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Trióxido
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco; aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado y trasladar al paciente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego utilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300
FSSALUD EN LINEA: 0801.10200

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades ambientales.



Composición Química:

Hexaconazole	100 g
Aditivos	c.s.p.1l

Registro PQUA N° 412-SENASA



Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.
Teléfono: +86-25-52782915

Importado y
Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Contenido Neto: **500 ml**

N° Lote: _____
F. Form.: _____
F. Venc.: _____

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

S-PRONT® 100EC, es un fungicida triazol, sistémico con acción curativa y preventiva; empleado en el control de hongos. Presenta un movimiento sistémico ascendente a través del xilema, actuando conjuntamente con el agua y los elementos minerales absorbidos.

S-PRONT® 100 EC, actúa en aplicaciones foliares para el control de enfermedades en cultivos como espárrago.

S-PRONT® 100 EC, al inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la demitilación de la ergosterina, disminuyendo la permeabilidad de la membrana celular de la planta.

S-PRONT® 100EC, se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo y completar.

S-PRONT® 100 EC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (motocicla a palanca, a motor).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
ESPARRAGO	"Cercosporiosis"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.75	-	14	0.02
VID	"Oidiois"	<i>Uncinula necator</i>	0.5	-	7	0.1
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	-	200	7	0.01

LMR: Límite Máximo Residuos **PC:** Período de Carenia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

En espárrago se recomienda hasta un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Aplicar antes de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
Compatible con pesticidas de uso común, excepto aquellos que son de naturaleza alcalina.

Fitotoxicidad
No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines pretendidos, sin perjuicio de lo acordado con los organismos e instituciones correspondientes.

recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

