PROYECTO DE ETIQUETA – TOTEM x 1 kg

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fosfonatos.
- **Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).**
- En caso de ingestión accidental, mantener al paciente en reposo. Lavar la boca con agua, no inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al paciente hacia el aire fresco y mantenerlo en reposo.

NOTA AL MÉDICO

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Evitar que el producto se aplique en napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TOTEM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fosetyl aluminium ..... 800 g/kg
Aditivos..... c.s.p… 1.0 kg

Reg. N° PQUA N° 416-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

CONTENIDO NETO:

1 KILO

Fabricado y formulado por:
BIESTERFELD SHANGHAI CO., LTD.
Unit 906-07, Harbour Ring Plaza,
18 Xi Zang Road (M),
Shanghai 200001, China.

Importado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia 148 Piso 7,
San Isidro. Lima 27 - Perú.
Teléfono: (01) 630-6400. Fax: (01) 630-6410

N° de Lote :

Fecha de Fabricación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

GENERALIDADES

TOTEM es un fungicida sistémico, que se absorbe rápida y fácilmente a través de las hojas y/o raíces de la planta, con ambos tipos de translocación acropétala y basipétala.

TOTEM refuerza y estimula las reacciones de defensa de la planta, inhibiendo así la germinación de esporas y/o bloqueando el desarrollo del micelio y de la esporulación en la interfase hospedero-patógeno.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

TOTEM se aplica en "drench" dirigido a la base o raíces de la planta empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO

Cultivo	Enfermedad		Dosis (kg/cil)	Dosis (kg/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico				
Palto	Tristeza del palto	*Phytophthora cinnamomi*	0.5-0.75	3.0-3.75	15	50
Pimiento	Azul o hielo	*Phytophthora capsici*	0.7	---	15	130

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y NÚMERO DE APLICACIONES

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña. El intervalo de aplicación es de mínimo 60 días.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD.

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina (pH > 9) y de los fertilizantes foliares. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD. TOTEM no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO