

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD en línea (línea gratuita): 08001-0828 / 411- 8000, opción 4
CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DEFFOL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate 480 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 422 - SENASA

Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750,
Jinan, Shandong, China.

F ax: +86 – 531 – 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579 Oficina 703 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DEFFOL® es un herbicida concentrado soluble en agua, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas, tanto anuales como perennes señaladas en el cuadro de usos. Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Modo de aplicación:

Preparar la mezcla en tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ALCACHOFA	Coquito Gramma dulce Rabo de zorro Gramma china Verdolaga Amor seco	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i>	5	14	0,1
CAÑA DE AZÚCAR	Verdolaga Gramma china	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sorghum halepense</i>	5	0	0,1
ESPARRAGO	Gramma china Coquito Gramma dulce Cadillo Yuyo Verdolaga Moco de pavo Amor seco Capulí Rabo de zorro Pata de gallina	<i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Eleusine indica</i>	2 - 3	5	0,1
MANDARINA	Verdolaga Gramma china Kikuyo	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Pennisetum clandestinum</i>	5	1	0,5
PALTO	Coquito Gramma dulce Rabo de zorro Gramma china Verdolaga Amor seco	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i>	5	7	0,1
VID	Amor seco Verdolaga Yuyo Coquito Pata de gallina	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Eleusine indica</i>	4	0	0,05
GRANADA	Pata de gallina	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Eleusine indica</i>	5	N.A.	0,1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de carencia

N.A: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

DEFFOL® debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliamente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible en mezcla de tanque con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otros, así como con herbicidas de tipo hormonal, ya que pueden modificar o reducir el efecto del Glifosato.

FITOTOXICIDAD:

DEFFOL® es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

