

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya tenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fosfonometil glicina

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 a 20 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15-20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

ESSALUD en línea (línea gratuita): 08001-0828 / 411- 8000, opción 4
CAISAC (01) 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas fráticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DEFFOL®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate 480 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 422 - SENASA

Titular del Registro, importado
y distribuidor:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencioncliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd

Address: Building 2, N° 6, Suyuan Road, XuanWu District, Nanjing, China.
Telef: (86) 25-84738100

Contenido Neto: 4L

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

DEFFOL® es un herbicida concentrado soluble en agua, post emergente no selectivo, para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas, tanto anuales como perennes señaladas en el cuadro de usos. Actúa de forma sistémica y se mueve a través de la planta del punto de contacto con el follaje y se trasloca hasta el sistema radicular. Los efectos visibles de su acción sobre las malezas anuales, ocurren de 2 a 4 días después de la aplicación y en malezas perennes no antes de los 7 días o más. No es persistente en el suelo.

Modo de aplicación:

Preparar la mezcla en tanque con la cantidad de agua requerida. Diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, remover bien y completar el volumen de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ALCACHOFA	Coquito Gramma dulce Rabo de zorro Gramma china Verdolaga Amor seco	Cyperus rotundus Cynodon dactylon Setaria verticillata Sorghum halepense Portulaca oleracea Bidens pilosa	5	14	0,1
CAÑA DE AZÚCAR	Verdolaga Gramma china	Portulaca oleracea Sorghum halepense	5	0	0,1
ESPARRAGO	Gramma china Coquito Gramma dulce Cadillo Yuyo Verdolaga Moco de pavo Amor seco Capulí Rabo de zorro Pata de gallina	Sorghum halepense Cyperus rotundus Cynodon dactylon Cenchrus echinatus Amaranthus dubius Portulaca oleracea Echinocloa colonum Bidens pilosa Nicandra physalodes Setaria verticillata Eleusine indica	2 - 3	5	0,1
MANDARINA	Verdolaga Gramma china Kikuyo	Portulaca oleracea Sorghum halepense Pennisetum clandestinum	5	1	0,5
PALTO	Coquito Gramma dulce Rabo de zorro Gramma china Verdolaga Amor seco	Cyperus rotundus Cynodon dactylon Setaria verticillata Sorghum halepense Portulaca oleracea Bidens pilosa	5	7	0,1
VID	Amor seco Verdolaga Yuyo Coquito Pata de gallina	Bidens pilosa Portulaca oleracea Amaranthus dubius Cyperus rotundus Eleusine indica	4	0	0,05
GRANADA	Pata de gallina	Cynodon dactylon Eleusine indica	5	N.A.	0,1

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de carencia

N.A: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

DEFFOL® debe aplicarse sobre malezas que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. Realizar las aplicaciones cuando las malezas están en activo crecimiento. Aplicar foliamente. Realizar una aplicación por campaña como máximo (2 campañas al año).

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible en mezcla de tanque con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otros, así como con herbicidas de tipo hormonal, ya que pueden modificar o reducir el efecto del Glifosato.

FITOTOXICIDAD:

DEFFOL® es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

