Grupo Silvestre	**ETIQUETA**	**Código: GS-SPS-RG-EQ-** **Revisión: 00** **Aprobado: JR** **Fecha: 29-04-10** **Página: 2 de 3**
	BULL FIRE 240 SC - HANGZHOU CHANGHE	

28,3 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,5 ± 0,2

15,0 ± 0,3

2,3

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Pyrazole
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No se conoce antídoto especifico, Tratamiento es sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040
SILVESTRE (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no arrojar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

BullFire® 240 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspension concentrada (SC)

Composición Química:

Clorfenapir ..... 240 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Registro PQUA Nº 440 - SENASA

Contenido Neto: **1 L**

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Silvestre Protección Vegetal

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupositvestre.com.pe

Formulado por: **HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD**
64 Riverside Wharf Road, Changhe Town,
Hangzhou Zhejiang Province China.

Importado, envasado y distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
BULL FIRE® 240 SC actúa por contacto e ingestión y también tiene actividad translaminar. Es utilizado para el control de la polilla (*Tuta absoluta*) en el cultivo de tomate.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cilindro 200 L	L / ha		
Pimiento	Acaro hialino	*Polyphagotarsonemus latus*	150	0.30	0	0.05
Tomate	Polilla	*Tuta absoluta*	125	0.25	3	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia.

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.
Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
BULL FIRE® 240 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD
BULL FIRE® 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Medidas en cm.

Envase: PEAD

L. BULL FIRE	L. BULL FIRE	L. SILVESTRE	B. TOXICOLÓGICA
DEGRADADO	**PANTONE 419 C**	**PANTONE 350 C**	**PANTONE YELLOW C**

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE