

30 x 15 cms

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. El contacto con la piel puede causar picazón, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamado parestesia. Los efectos son transitorios y duran hasta 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Thiamethoxam: Neonicotinoides, Lambda-cyhalothrin: Piretroides
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
  - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - Teléfonos de emergencia: SAMU:106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434 5600; CISPROQUIM: 080050847
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de desecho dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración o cuando no permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración. Respetar una banda de no aplicación hacia áreas de vegetación natural de al menos 5 m en arroz y 10 m en papa.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. Evite que el producto alcance cualquier cuerpo de agua (estancada o corriente) o el suelo, debido a los efectos potenciales a largo plazo que lambda-cyhalothrin podría causar en los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 m en arroz y 30 m en papa. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. Cuando haga la aplicación, evite que el producto llegue al borde de los cuerpos de agua superficial cercanos al campo, tomando en cuenta zonas de no aplicación adecuadas y otras medidas que eviten la escorrentía.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# CONQUEST®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA.

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Thiamethoxam .....	141 g/L
Lambda-cyhalothrin .....	106 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 429 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection, S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguin 335, Of. 808.  
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú  
 RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por :**

**TQC** TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C N° 20307150981

**Formulado por:**

Syngenta Crop Protection, LLC  
 3905 Highway 75, St. Gabriel  
 Louisiana 70776  
 Estados Unidos

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

**1 Litro**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambda-cyhalotrina.
- Modo de acción: thiametoxam de contacto y sistémico; lambda-cyhalothrin de contacto, con acción residual.
- Mecanismo de acción: thiametoxam interfiere con los receptores nicotínicos de acetilcolina en sus sistemas nerviosos; lambda-cyhalothrin penetra en la cutícula del insecto para interrumpir la conducción nerviosa.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	mL/ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	250		14	*6/**0.1
	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	150 - 200	150 - 200		
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturalis	250	500	14	*0.25/**0.01
		Premnotrypes lathithorax				

P. C.: Periodo de Carencia L.M.R. : Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)  
 \*Thiametoxam/\*\* Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Papa: Realizar 2 aplicaciones por campaña/año con un intervalo no menor a 15 días. La primera debe hacerse cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los Andes y con un 80 a 100% de la emergencia de las plantas. Evitar la aplicación al menos 15 días antes de la floración.
- Arroz: Para el control de mosca minadora hacer 1 aplicación/campaña; 2 aplicaciones al año, utilice la dosis más alta en agroecosistemas y estaciones del año más calurosos, donde las infestaciones de la plaga son más agresivas y pueden producir daños muy significativos. Evitar la aplicación al menos 10 días antes de la floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

- 24 horas

**COMPATIBILIDAD**

- **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

**FITOTOXICIDAD**

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



30 x 15 cms

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar asperión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. El contacto con la piel puede causar picazón, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamado parestesia. Los efectos son transitorios y duran hasta 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Thiamethoxam: Neonicotinoides, Lambda-cyhalothrin: Piretroides
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
  - Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
  - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - Teléfonos de emergencia: SAMU:106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434 5600; CISPROQUIM: 080050847
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de desecho dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración o cuando no permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración. Respetar una banda de no aplicación hacia áreas de vegetación natural de al menos 5 m en arroz y 10 m en papa.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. Evite que el producto alcance cualquier cuerpo de agua (estancada o corriente) o el suelo, debido a los efectos potenciales a largo plazo que lambda-cyhalothrin podría causar en los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 m en arroz y 30 m en papa. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. Cuando haga la aplicación, evite que el producto llegue al borde de los cuerpos de agua superficial cercanos al campo, tomando en cuenta zonas de no aplicación adecuadas y otras medidas que eviten la escorrentía.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# CONQUEST®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA.

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Thiamethoxam .....	141 g/L
Lambda-cyhalothrin .....	106 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 429 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection, S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguín 335, Of. 808.  
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú  
 RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por :**

**TQC** TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C N° 20307150981

**Formulado por:**

Syngenta Chemicals B.V.  
 Rue de Tyberchamps, 37  
 Bélgica

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

**1 Litro**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambda-cyhalotrina.
- Modo de acción: thiametoxam de contacto y sistémico; lambda-cyhalotrina de contacto, con acción residual.
- Mecanismo de acción: thiametoxam interfiere con los receptores nicotínicos de acetilcolina en sus sistemas nerviosos; lambda-cyhalotrina penetra en la cutícula del insecto para interrumpir la conducción nerviosa.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	mL/ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	250		14	*6/**0.1
	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	150 - 200	150 - 200		
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturalis	250	500	14	*0.25/**0.01
		Premnotrypes lathithorax				

P. C.: Periodo de Carencia L.M.R. : Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

\*Thiamethoxam/\*\* Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- **Papa:** Realizar 2 aplicaciones por campaña/año con un intervalo no menor a 15 días. La primera debe hacerse cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los Andes y con un 80 a 100% de la emergencia de las plantas. Evitar la aplicación al menos 15 días antes de la floración.
- **Arroz:** Para el control de mosca minadora hacer 1 aplicación/campaña; 2 aplicaciones al año, utilice la dosis más alta en agroecosistemas y estaciones del año más calurosos, donde las infestaciones de la plaga son más agresivas y pueden producir daños muy significativos. Evitar la aplicación al menos 10 días antes de la floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

- 24 horas

**COMPATIBILIDAD**

- **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

**FITOTOXICIDAD**

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**



30 x 15 cms

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. El contacto con la piel puede causar picazón, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamado parestesia. Los efectos son transitorios y duran hasta 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Thiamethoxam: Neonicotinoides, Lambda-cyhalothrin: Piretroides
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
  - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - Teléfonos de emergencia: SAMU:106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434 5600; CISPROQUIM: 080050847
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios, no aplicar en época de floración o cuando no permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración. Respetar una banda de no aplicación hacia áreas de vegetación natural de al menos 5 m en arroz y 10 m en papa.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. Evite que el producto alcance cualquier cuerpo de agua (estancada o corriente) o el suelo, debido a los efectos potenciales a largo plazo que lambda-cyhalothrin podría causar en los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 m en arroz y 30 m en papa. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. Cuando haga la aplicación, evite que el producto llegue al borde de los cuerpos de agua superficial cercanos al campo, tomando en cuenta zonas de no aplicación adecuadas y otras medidas que eviten la escorrentía.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# CONQUEST®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA.

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Thiamethoxam .....	141 g/L
Lambda-cyhalothrin .....	106 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 429 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection, S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguin 335, Of. 808.  
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú  
 RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por :**

**TQC**  
 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C N° 20307150981

**Formulado por:**

Syngenta Protecao de Cultivos Ltda  
 Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP 332  
 Brasil

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

**1 Litro**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambda-cyhalotrina.
- Modo de acción: thiametoxam de contacto y sistémico; lambda-cyhalothrin de contacto, con acción residual.
- Mecanismo de acción: thiametoxam interfiere con los receptores nicotínicos de acetilcolina en sus sistemas nerviosos; lambda-cyhalothrin penetra en la cutícula del insecto para interrumpir la conducción nerviosa.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	mL/ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	250		14	*6/**0.1
	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	150 - 200	150 - 200		
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturalis	250	500	14	*0.25/**0.01
		Premnotrypes lathithorax				

P. C.: Periodo de Carencia L.M.R. : Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

\*Thiametoxam/\*\* Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Papa: Realizar 2 aplicaciones por campaña/año con un intervalo no menor a 15 días. La primera debe hacerse cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los Andes y con un 80 a 100% de la emergencia de las plantas. Evitar la aplicación al menos 15 días antes de la floración.
- Arroz: Para el control de mosca minadora hacer 1 aplicación/campaña; 2 aplicaciones al año, utilice la dosis más alta en agroecosistemas y estaciones del año más calurosos, donde las infestaciones de la plaga son más agresivas y pueden producir daños muy significativos. Evitar la aplicación al menos 10 días antes de la floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

• 24 horas

**COMPATIBILIDAD**

• **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

**FITOTOXICIDAD**

• La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



30 x 15 cms

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Causa irritación a la piel e irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. El contacto con la piel puede causar picazón, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamado parestesia. Los efectos son transitorios y duran hasta 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Thiamethoxam: Neonicotinoides, Lambda-cyhalothrin: Piretroides
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
  - Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
  - Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
  - No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
  - Teléfonos de emergencia: SAMU:106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434 5600; CISPROQUIM: 080050847
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración o cuando no permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos en floración. Respetar una banda de no aplicación hacia áreas de vegetación natural de al menos 5 m en arroz y 10 m en papa.
- Peligroso para peces y organismos acuáticos. Evite que el producto alcance cualquier cuerpo de agua (estancada o corriente) o el suelo, debido a los efectos potenciales a largo plazo que lambda-cyhalothrin podría causar en los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 m en arroz y 30 m en papa. Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales. Cuando haga la aplicación, evite que el producto llegue al borde de los cuerpos de agua superficial cercanos al campo, tomando en cuenta zonas de no aplicación adecuadas y otras medidas que eviten la escorrentía.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# CONQUEST®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA.

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

Suspensión Concentrada (SC)

**Composición**

Thiamethoxam .....	141 g/L
Lambda-cyhalothrin .....	106 g/L
Aditivos .....	c.s.p. 1 litro

Reg. PQUA N° 429 - SENASA

**Titular del Registro:**

Syngenta Crop Protection, S.A. Sucursal Perú  
 Av. Manuel Olguin 335, Of. 808.  
 Urb. Los Granados, Santiago de Surco. Lima, Perú  
 RUC: 20501511740

**Importado y Distribuido por :**

**TQC**  
 TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
 Calle René Descartes No 311  
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
 Lima - Perú.  
 Telf: 612-6565, Fax: 348-1020  
 R.U.C N° 20307150981

**Formulado por:**

Syngenta Production France S.A.S.  
 Route de la Gare - BP1  
 F-30670 Aigues - Vives  
 Francia

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Contenido Neto:

**1 Litro**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CONQUEST®** es un nuevo insecticida que contiene dos ingredientes activos: thiametoxam y lambda-cyhalotrina.
- Modo de acción: thiametoxam de contacto y sistémico; lambda-cyhalotrin de contacto, con acción residual.
- Mecanismo de acción: thiametoxam interfiere con los receptores nicotínicos de acetilcolina en sus sistemas nerviosos; lambda-cyhalotrin penetra en la cutícula del insecto para interrumpir la conducción nerviosa.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de **CONQUEST®** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar.
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).
- **CONQUEST®** puede ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo en la zona donde se encuentran los insectos a controlar.
- Para obtener un flujo de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL/200 L agua	mL/ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Tagosodes orizicolus	250		14	*6/**0.1
	Mosca minadora	Hydrellia wirthi	150 - 200	150 - 200		
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturalis	250	500	14	*0.25/**0.01
		Premnotrypes lathithorax				

P. C.: Periodo de Carencia L.M.R. : Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

\*Thiamethoxam/\*\* Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- **Papa:** Realizar 2 aplicaciones por campaña/año con un intervalo no menor a 15 días. La primera debe hacerse cuando se observen los primeros adultos del gorgojo de los Andes y con un 80 a 100% de la emergencia de las plantas. Evitar la aplicación al menos 15 días antes de la floración.
- **Arroz:** Para el control de mosca minadora hacer 1 aplicación/campaña; 2 aplicaciones al año, utilice la dosis más alta en agroecosistemas y estaciones del año más calurosos, donde las infestaciones de la plaga son más agresivas y pueden producir daños muy significativos. Evitar la aplicación al menos 10 días antes de la floración.

**PERIODO DE REINGRESO**

- 24 horas

**COMPATIBILIDAD**

- **CONQUEST®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados.

**FITOTOXICIDAD**

- La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

