15 mm | 93 mm | 29 mm | 185 mm | 29 mm | 87 mm | 35 mm

## MODO DE EMPLEO

•Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de **Gesaprim® 90 WG** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
•Para aplicaciones en post emergencia, añadir un surfactante no iónico de último y agitar nuevamente.
•**Gesaprim® 90 WG** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas de tipo abanico plano.
•En la aplicación de **Gesaprim® 90 WG** el volumen de agua por hectárea no es el factor más importante sino su correcta y uniforme distribución sobre la superficie del suelo a tratar y/o malezas a controlar. En condiciones prácticas, el volumen de agua puede variar entre 200 a 400 litros por hectárea con equipos terrestres.
•Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

## CUADRO DE USOS

**Consulte con un Ingeniero Agrónomo**

| CULTIVO | MALEZAS | | DOSIS (Kg / ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | | | |
| **Maíz (grano)** | Yuyo<br>Chamico | ***Amaranthus*** spp.<br>***Datura stramonium*** | 1.0 - 2.0 | 30 | 0.25 |
| **Sorgo** | Pata de gallina<br>Verdolaga | ***Eleusine indica***<br>***Portulaca oleracea*** | | | |
| **Caña de Azúcar** | Lechera<br>Cadillo | ***Euphorbia*** spp.<br>***Cenchrus echinatus*** | 4.0 - 6.0 | | 0.50 |
| Utilizar la dosis baja en suelos poco adsorbentes y la dosis alta en aquellos suelos de alta adsorción. En suelos arenosos no se recomienda el uso de **Gesaprim 90 WG.** | | | | | |

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón.

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

•**Gesaprim® 90 WG** se aplica en pre o post emergencia temprana de las malezas (máximo 2 4 hojas verdaderas) y en cualquier estado de desarrollo de los cultivos recomendados.
•Aplicar **Gesaprim® 90 WG** sobre terreno bien preparado (mullido) y con humedad adecuada (capacidad de campo).
•Se recomienda 01 aplicación/campaña con **Gesaprim® 90 WG.**
•No aplicar **Gesaprim® 90 WG** con viento que pueda arrastrar el producto a cultivos vecinos y perjudicarlos.

## PERIODO DE REINGRESO

•No reingresar al área tratada sin ropa protectora hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD

•En principio **Gesaprim® 90 WG** puede ser mezclado con otros herbicidas comúnmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

## FITOTOXICIDAD

•Siempre que **Gesaprim® 90 WG** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad.
•No se recomienda utilizar **Gesaprim® 90 WG** en cultivos de maíz choclo ni maíz chala pues son de corto ciclo vegetativo y puede resultar afectado el siguiente cultivo sembrado.
•Si poco después de una aplicación de **Gesaprim® 90 WG** se perdiera el cultivo por causa de plaga, enfermedad, sequía, etc. se recomienda volver a sembrar el mismo cultivo.

# Gesaprim® 90 WG

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### *Gránulos Dispersables en Agua - WG*

***Composición***
*Atrazina ..... 900 gIKg*
*Aditivos ..... c.s.p 1 Kg*

***Reg. N° : 364 - 97 - AG - SENASA***

***Titular de Registro***
***Syngenta Crop Protection S.A.***
***Sucursal Perú***
***Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima, Perú***
***RUC: 20501511740***
***Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876***

***Importado y Distribuído por:***

TQC
**TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.**
*Separadora Industrial Mz."E" Lote 12*
*Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima*
*Telf: 348-1103 Fax: 348-1020*
*RUC : 20307150981*

***Formulado por:***
***Syngenta Crop Protection INC.***
***Estados Unidos***

***Lote Nº.:***

***Fecha de Form.:***

***Fecha de Venc.:***

***NO CORROSIVO – NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO***

Los nombres de productos que contengan ® o ™.
El logo SYNGENTA y el marco CP PAANI
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

**1kilo**

syngenta®

## LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## MANTENER BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

•Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
•Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C o superiores a 35 °C.
•Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
•Perjudicial si se ingiere. Evitar la ingestión del producto.
•Evitar la inhalación de polvo. No inhalar la nube de aspersión.

## PRIMEROS AUXILIOS

•Grupo Químico: Triazinas
•En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
•En caso de emergencia llamar a: **CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.**
•Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
•En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
•En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
•Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
•No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

•Perjudicial para la flora.
•Peligroso para peces y organismos acuáticos.
•No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
•En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

## MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

•Después de usar el contenido destruir este envase, y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
•Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# LIGERAMENTE PELIGROSO
# CUIDADO

V2 03 2014