

21 cm

**PERIODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:** FORTE® 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y los de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:** No tiene efectos sobre otros cultivos.

**EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:** No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Emplear cualquier equipo convencional terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.		L.M.R.	
	Nombre Común	Nombre Científico	g/200 L	kg/ha	(días)	(ppm)		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250	0.5	14	0.02		
Arroz	Rizoctoniasis	<i>Rhizoctonia oryzae</i>	300 - 350	--	58	10		
Cebolla	Pudrición blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	500	1.5	7	0.2		
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	1.0-1.25	3	15		
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500	1.0	3	5		
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250		14	0.02		
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500	1.0	3	5		
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300		7	10		

P.C.: Período de carencia. L.M.R.: Límite máximo de residuos.

# FORTE®

## 50 PM

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE (WP)**

**Composición:**  
Iprodione ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 187 - SENASA**  
**Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.**

Nombre común : Iprodione  
Nombre químico : 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioximidazolidine-1-carboxamide  
Fórmula estructural : 

Fórmula empírica : C<sub>17</sub>H<sub>15</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
Peso molecular : 330.17 g/mol  
Grupo químico : Dicarboximide

**Propiedades físicas y químicas**  
Apariencia : Sólido (polvo)  
Color : Blanquecino

Importado y Distribuido por:  
  
**Formulado por:**  
**IPROCHEM COMPANY LIMITED**  
35th Floor, Guomao Business Mansion,  
No. 3005 Nantou Rd., Luohu District,  
Shenzhen, Guangdong Province, China.

PJ, Camino de Acceso N°02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Dicarboximide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106**  
**NEOAGRUM S.A.C.: (01) 617-6400**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FORTE® 50 PM** es un fungicida de contacto y sistémico localizado con acción protectora y curativa.

**FORTE® 50 PM** actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoría de cultivos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad. Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en pimiento.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



<b>BOLSA TRILAMINADA</b>	 NEGRO	<b>B.TOXICOLOGICA</b>  PANT. 293 C	<b>LOGO PRODUCTO</b>  PANT. 280 C	 PANT. 355 C	<b>LOGO NEOAGRUM</b>  C 89/ M 19/ Y 72/ K 60 PANTONE 343 C	 C 50/ M 1/ Y 100/ K 20 PANTONE 377C	 Degradé Amarillo Oscuro C 0/ M 45/ Y 100/ K 0 Degradé Amarillo Claro C 0/ M 20/ Y 100/ K 0 AMARILLO OSCURO PANTONE 137C AMARILLO CLARO PANTONE 7406C
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del GRUPO SILVESTRE**