

FORTE[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Iprodione 500 g/kg
Aditivos c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 187 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 250 g
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCHEN AGRO CO., LTD
17-19 th Floor, N°33, He Nan Road(s) Shanghai, 200002 P.R.
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Toxicidad por ingestión leve si es ingerido.
- Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias, no aspirar el polvo de la aspersión, usar el equipo de protección respiratoria.
- Causa irritación moderada a los ojos, usar equipo de protección ocular (gafas).
- El contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.
- Es ligeramente irritante a la piel.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar en casa o dentro de la habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico: Diantolimid.**
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua durante 15 minutos. Llevar al paciente al médico especialista oftalmólogo.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente al médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.
- En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 NEO AGRUM SAC: 617-6400
CISPROQUIM: 0800-50-847 ALOESSALUD: 0801-20200 (Gratuito)

- Nota al médico: No hacer análisis específicos. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- "Después de lavar el envase limpie el centro de acopio autorizado."

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hasta cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por las autoridades para tal fin.



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha		
Alcachofa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	0.5	14	0.02
Arroz	Rizoctonia	<i>Rhizoctonia oryzae</i>	0.3 - 0.35	--	58	10
Cebolla	Pudrición blanda	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.5	1.5	7	0.2
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	1.5	14	1.0
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	--	14	0.02
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	1.0	3	5
Vid	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	--	7	10

P.C.: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

