

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

JAKE 200 SL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid.....200 g/l
Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N° 376

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima, Perú. Telf: 336 5428

FABRICADO Y FORMULADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD,
Xiepu town, Zhenhai District, Ningbo; Zhejiang province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo China

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 500ml

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

CONSEJOS DE USO Y MANEJO

JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinoide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translinar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS**

Cultivos	PLAGAS		Dosis		P.C. (días)	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Cil 200L	L/Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplaxis longifila</i>	-	0.50	14	0.01
Palto	Queresa del palto	<i>Florinia florinae</i>	0.10	0.30	N.R.*	0.01

P.C.: Periodo de carencia en días

LMR: Limite máximo de residuos expresados en ppm.

N.R*.: No requerido. Valido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir antes de la floración.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

