

**"LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Causa daño temporal a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

No almacenar en casas de habitación. Buen almacenamiento (protegerlos del exceso de humedad, temperatura, siempre bajo techo, no colocarlo directamente al piso, utilizar estibas, la altura de arraje no debe ser mayor de 2 metros, y el almacén debe tener buena ventilación).

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoides.  
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico. - En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. - No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático. - En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
 CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO: 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración. - Tóxico para organismos acuáticos.  
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
 Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. - No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN**

El equipo de aspersión debe lavarse interna y externamente en el campo y el líquido de enjuague asperjado en un cultivo en el cual el producto esté registrado, asegurándose que la dosis recomendada no esté excedida por la aplicación repetida en la misma área. Es indispensable que se enjuague el sistema de aspersión tres veces, con una pequeña cantidad de agua cada vez.

**MANEJO DE DERRAMES**

Las precauciones que se deben de seguir en caso de derrame son: • Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bombas, chispas o llamas en el área de peligro). • No tocar ni caminar sobre el material derramado. • Usar ropa protectora; como guantes, botas, pechera, mascarilla, gafas protectoras, máscara contra el polvo. • Si es posible, detener el derrame y luego absorberlo con material absorbente apropiado. • Contener los pequeños derrames de Acetamiprid cubriéndolos con tierra, arena u otro material absorbente apropiado. • En caso fuera mayor el derrame del producto, se deberá contener alzando un muro de tierra o arena alrededor de la zona de derrame, o cubierto con los materiales antes mencionados. • Cuidar que el producto derramado no se filtre en las alcantarillas, desagües, vías u otras corrientes de agua. • Ajustar la posición de los envases rotos para minimizar mayores derrames. - En caso el producto sea arrastrado por una corriente de agua, se debe orientar la recuperación del material contaminado, estableciendo barreras de contención aguas abajo, se pueden colocar mallas de plástico, así como sogas de determinado diámetro que permitan que el agua circule y que el Acetamiprid que está unido a los sedimentos se detenga, para levantarlo en manías o baldes, estos se deben colocar sobre envases de plástico o polietileno para su posterior descarte. • Los trabajos de recuperación del producto deben realizarse siempre a favor del viento para evitar inhalaciones, y siempre alejando al personal no autorizado de la zona de derrame.




**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

Registro : Registro POJA N° 376 – SENASA  
 Ingrediente activo : ACETAMIPRID  
 Nombre químico (IUPAC) : (E)-N-[6-chloro-3-pyridylmethyl]-N'-cyano-N'-methylacetamidine  
 Nombre común : Acetamiprid  
 Fórmula empírica : C<sub>11</sub>H<sub>8</sub>ClN<sub>4</sub>  
 Peso molecular : 222.17 g/mol  
 Grupo químico : Neonicotinoides



**Propiedades físicas y químicas**

Aspecto : Líquido (a 20°C)  
 Estado físico : Anaranjado claro  
 Color : Característico  
 Olor :  
 Densidad aparente : 1.06 g/ml 20 °C.  
 Reactividad con el material de envases : Es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.  
 Formulador :

NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO., LTD.  
 Oficina: Xiepu Town, Zhentai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
 Domicilio: Xiepu Town, Zhentai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
 Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China



Titular del Registro : Aris Industrial S.A.  
 Importador y Distribuidor : Aris Industrial S.A.  
 Av. Industrial 491, Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 336-5428  
 E-mail: vquimicos@aris.com.pe

**NO CORROSIVO**      **NO INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JAKE 200 SL es un insecticida Neonotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translinar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | PLAGA                             |                               | DOSIS      |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------|--------------|--------------|
|                | NOMBRE COMÚN                      | NOMBRE CIENTÍFICO             | L/200L     | L/ha |              |              |
| Espárrago      | Mosquilla del brote               | <i>Prodiplasis longifolia</i> | -          | 0.5  | 14           | 0.01         |
| Pallo          | Queresa del pallo                 | <i>Florina florinae</i>       | 0.1        | 0.3  | N.R*         | 0.01         |
| Mandarina      | Queresa coma                      | <i>Lepidosaphes beckii</i>    | 0.1-0.2    | -    | 14           | 1            |
| Piniento       | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>         | 0.1        | -    | 7            | 0.3          |
| Cebolla        | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2        | -    | 7            | 0.02         |
| Tomate         | Caracha (Mosquilla de los brotes) | <i>Prodiplasis longifolia</i> | -          | 0.3  | 7            | 0.2          |
| Algodón        | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>         | -          | 0.2  | 14           | 0.7          |
| Vid            | Chanchito harinoso                | <i>Planococcus citri</i>      | 0.15       | -    | 3            | 0.5          |
| Palma aceitera | Spaethiella                       | <i>Spaethiella tritici</i>    | 0.2 - 0.3  | -    | 21           | 0.01         |
| Arándano       | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2 - 0.25 | -    | 1            | 2            |

PC: Periodo de Carenza en días  
N.R.\*: No requerir. Válido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

MODO DE ACCIÓN:

El Acetamiprid actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos, con acción mimética de la Acetilcolina (ACh) en la membrana de postsinapsis, dando lugar a la acumulación de la misma y provocando la transmisión ininterrumpida de los impulsos nerviosos, lo cual lleva a la parálisis y muerte del insecto. Manifiesta una actividad translinar y sistémica, y actúa por contacto e ingestión.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

MÉTODOS DE APLICACIÓN:

JAKE 200SL se utiliza en aplicaciones foliares, mediante equipos de aplicación terrestre (pulverizadores, atomizadores) previa calibración del equipo y preparación de la mezcla de aplicación.

CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE APLICACIÓN:

El equipo de aspersión debe ser calibrado al principio de cada operación, después de reparar el equipo o cuando se hayan instalado nuevas boquillas. El caudal de la boquilla se debe determinar recogiendo y midiendo el volumen de líquido de aspersión emitido en 1 minuto. Las boquillas deben reemplazarse cuando la descarga de líquido aumente un 5% por encima de la descarga del catálogo a una presión dada. El método más seguro para determinar la descarga del líquido es llenar el tanque vacío con un volumen conocido de agua, luego se registra el tiempo que se emplea para vaciar el tanque. La operación debe repetirse tres veces para encontrar el caudal promedio de líquido.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO





PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid..... 200 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PUNA N° 376 - SENASA. Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. INDUSTRIAL 491 Lima - Perú Tel.: 3953428



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 395 5428

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de emergencia llamar a: ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 395-5428, CISPPOQUIM: 0800-50847, CETOX: 0800-71911

ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

Después de cada uso, lavar el equipo y los envases tres veces. Los envases vacíos deben ser lavados tres veces con agua y jabón, luego enjuagados y almacenados en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido Neto: 125ml

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:





PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADA SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Activo principal

Aditivos

..... 200 g/L  
..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 376 - SEMASA

Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO., LTD.  
Domicilio: Xipu Town, Zhenthai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangsu St., 31500 Ningbo, China

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- En caso de emergencia, llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-9000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego indicarlo inactivado o perforado y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin. • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.

Contenido Neto: 250ml

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reintegrar al área tratada en las primeras 24 horas. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávese con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico. - En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. - No tiene antidoto específico. El tratamiento médico es sintomático. - En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-9000 ANEXO: 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego indíquelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto. - Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto. - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE- SL

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro N° 376 - SENASA

Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido neto: 500ml

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translocación. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua. Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla.

\*CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO\*

| CULTIVO        | PLAGA                            |                                 | DOSIS    |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
|                | NOMBRE COMÚN                     | NOMBRE CIENTÍFICO               | L/200L   | L/ha |           |           |
| Espárrago      | Mosquilla del brote              | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | -        | 0.5  | 14        | 0.01      |
| Pallo          | Queresa del pallo                | <i>Forina florinae</i>          | 0.1      | 0.3  | N.R*      | 0.01      |
| Mandarina      | Queresa coma                     | <i>Lepidosaphes beckii</i>      | 0.1-0.2  | -    | 14        | 1         |
| Pimiento       | Mosca blanca                     | <i>Bemisia tabaci</i>           | 0.1      | -    | 7         | 0.3       |
| Cebolla        | Trips                            | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.2      | -    | 7         | 0.02      |
| Tomate         | Caraña (Mosquilla de los brotes) | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | -        | 0.3  | 7         | 0.2       |
| Algodón        | Mosca blanca                     | <i>Bemisia tabaci</i>           | -        | 0.2  | 14        | 0.7       |
| Vid            | Chunchito harinoso               | <i>Phorococcus ciferi</i>       | 0.15     | -    | 3         | 0.5       |
| Palma aceitera | Spaethiella                      | <i>Spaethiella tritici</i>      | 0.2-0.3  | -    | 21        | 0.01      |
| Arándano       | Trips                            | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.2-0.25 | -    | 1         | 2         |

PC: Período de Curación en días  
N.R.\*: No requerido. Válido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.

LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- No reavivar con los ojos lavados con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428**  
**CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE- SL**

COMPOSICIÓN: ..... 200 g/L  
Acetamiprid ..... c.s.p. 1 L

Registro N° 376 - SENASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO. STD.  
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 1L  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
**JAKE 200 SL** es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translinar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar **JAKE 200 SL** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar **JAKE 200 SL** en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO        | PLAGA                         |                               | DOSIS    |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
|                | NOMBRE COMÚN                  | NOMBRE CIENTÍFICO             | L/200L   | L/ha |           |           |
| Esparago       | Mosquilla del brote           | <i>Prodiplasis longifolia</i> | -        | 0.5  | 14        | 0.01      |
| Pallo          | Queresa del pallo             | <i>Florinia florinae</i>      | 0.1      | 0.3  | N.R*      | 0.01      |
| Mandarina      | Queresa coma                  | <i>Lepidosaphes beccii</i>    | 0.1-0.2  | -    | 14        | 1         |
| Piniento       | Mosca blanca                  | <i>Bemisia tabaci</i>         | 0.1      | -    | 7         | 0.3       |
| Cebolla        | Trips                         | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2      | -    | 7         | 0.02      |
| Tomate         | Carpa Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplasis longifolia</i> | -        | 0.3  | 7         | 0.2       |
| Algodón        | Mosca blanca                  | <i>Bemisia tabaci</i>         | -        | 0.2  | 14        | 0.7       |
| Vid            | Chanchito harinoso            | <i>Planococcus citri</i>      | 0.15     | -    | 3         | 0.5       |
| Palma aceitera | Spaehiella                    | <i>Spaehiella tritici</i>     | 0.2-0.3  | -    | 21        | 0.01      |
| Arándano       | Trips                         | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2-0.25 | -    | 1         | 2         |

PC: Período de Carenza en días  
N.R.\*: No requerido. Válido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entro a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



"¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!"  
"¡MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No remover o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de intoxicación leve: Llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavados con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No beber agua específica. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el producto, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 3 metros.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con aguas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE- SL**

COMPOSICIÓN: 200 g/L  
Acelamiprid..... c.s.p. 1 L  
Aditivos .....

Registro N° 376 - SEMASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.  
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangsu STR., 31500 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 5L

Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translocación. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | PLAGA                             |                                | DOSIS    |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
|                | NOMBRE COMÚN                      | NOMBRE CIENTÍFICO              | L/200L   | L/ha |           |           |
| Esparago       | Mosquilla del brote               | <i>Prodiplotis longifolia</i>  | -        | 0.5  | 14        | 0.01      |
| Pallo          | Queresa del pallo                 | <i>Fraxinus floribunda</i>     | 0.1      | 0.3  | N.R.      | 0.01      |
| Mandarina      | Queresa comá                      | <i>Lepidoglyphus heckli</i>    | 0.1-0.2  | -    | 14        | 1         |
| Pimiento       | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>          | 0.1      | -    | 7         | 0.3       |
| Cebolla        | Tripa                             | <i>Trips tabaci</i>            | 0.2      | -    | 7         | 0.02      |
| Tomate         | Caracha (Mosquilla de los brotes) | <i>Prodiplotis longifolia</i>  | -        | 0.3  | 7         | 0.2       |
| Algodón        | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>          | -        | 0.2  | 14        | 0.7       |
| Vid            | Charchito harinoso                | <i>Phenococcus citri</i>       | 0.15     | -    | 3         | 0.5       |
| Palma escalera | Spañhuela                         | <i>Spaethiella tridactylus</i> | 0.2-0.3  | -    | 21        | 0.01      |
| Atridano       | Tripa                             | <i>Trips tabaci</i>            | 0.2-0.25 | -    | 1         | 2         |

PC: Periodo de Carencia en días  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm  
N.R.: No requerido. Véase solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la liberación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- No lavar con los ojos lavados con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE- SL

COMPOSICIÓN:  
Acetamiprid..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro N° 376 - SENASA

Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO. LTD.  
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia STR, 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 10L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translinar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO        | PLAGA                             |                             | DOSIS      |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|------|--------------|--------------|
|                | NOMBRE COMÚN                      | NOMBRE CIENTÍFICO           | L/200L     | L/ha |              |              |
| Esquítrago     | Mosquilla del brote               | <i>Protophila longifila</i> | -          | 0.5  | 14           | 0.01         |
| Pallo          | Queresa del pallo                 | <i>Protophila longifila</i> | 0.1        | 0.3  | N.R*         | 0.01         |
| Mandarina      | Queresa coma                      | <i>Lepidosaphes beckii</i>  | 0.1-0.2    | -    | 14           | 1            |
| Piniento       | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>       | 0.1        | -    | 7            | 0.3          |
| Cabolla        | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>        | 0.2        | -    | 7            | 0.02         |
| Tomate         | Caracha (Mosquilla de los brotes) | <i>Protophila longifila</i> | -          | 0.3  | 7            | 0.2          |
| Algodón        | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>       | -          | 0.2  | 14           | 0.7          |
| Vid            | Chanchito herrinso                | <i>Planococcus citri</i>    | 0.15       | -    | 3            | 0.5          |
| Palma aceitera | Spaethiella                       | <i>Spaethiella tristis</i>  | 0.2 - 0.3  | -    | 21           | 0.01         |
| Arandano       | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>        | 0.2 - 0.25 | -    | 1            | 2            |

PC: Periodo de Carenza en días  
N.R.\*: No requerido. Válido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entro a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- No ingerir o inhalar el producto.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE- SL

COMPOSICIÓN: 200 g/L  
Acetamiprid..... C.S.P. 1 L

Registro N° 376 - SEMASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.  
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 20L  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translocar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | PLAGA                           |                                 | DOSIS    |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|--------------|--------------|
|                | NOMBRE COMÚN                    | NOMBRE CIENTÍFICO               | L/200L   | L/ha |              |              |
| Espárrago      | Mosquilla del brote             | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | -        | 0.5  | 14           | 0.01         |
| Pallo          | Queresa del pallo               | <i>Florinia florifera</i>       | 0.1      | 0.3  | N.R*         | 0.01         |
| Mandarina      | Queresa coma                    | <i>Lepidosaphes beckii</i>      | 0.1-0.2  | -    | 14           | 1            |
| Pimiento       | Mosca blanca                    | <i>Bemisia tabaci</i>           | 0.1      | -    | 7            | 0.3          |
| Cebolla        | Trips                           | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.2      | -    | 7            | 0.02         |
| Tomate         | Caracha Mosquilla de los brotes | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | -        | 0.3  | 7            | 0.2          |
| Algodón        | Mosca blanca                    | <i>Bemisia tabaci</i>           | -        | 0.2  | 14           | 0.7          |
| Vid            | Chanchito harinoso              | <i>Planococcus citri</i>        | 0.15     | -    | 3            | 0.5          |
| Palma aceitera | Spaethiella                     | <i>Spaethiella tristis</i>      | 0.2-0.3  | -    | 21           | 0.01         |
| Araucario      | Trips                           | <i>Thrips tabaci</i>            | 0.2-0.25 | -    | 1            | 2            |

PC: Periodo de Cuidado en días  
N.R.: No requerido. Valido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las andadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.



"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es nocivo por ingestión y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- No ingerir o inhalar el producto.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consultar con el médico.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428  
CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX: 0800-71911 ESSALUD: 411-8000 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. Evitar la aplicación en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respingar una banda de no aplicación para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales en el área tratada durante las primeras 48 horas de aplicación del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE- SL

COMPOSICIÓN:  
Acetamiprid..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro N° 376 - SEMASA

Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO. LTD.  
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China  
Oficina Central: 21 Jiangxia STR., 315000 Ningbo, China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

Contenido Neto: 200L  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinóide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translinar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar JAKE 200 SL en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO        | PLAGA                             |                               | DOSIS    |      | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|------|-----------|-----------|
|                | NOMBRE COMÚN                      | NOMBRE CIENTÍFICO             | L/200L   | L/ha |           |           |
| Esparago       | Mosquilla del brote               | <i>Prodidiplos longifolia</i> | -        | 0.5  | 14        | 0.01      |
| Pallo          | Queresa del pallo                 | <i>Florinia florivora</i>     | 0.1      | 0.3  | N.R*      | 0.01      |
| Mandarina      | Queresa cona                      | <i>Lepidosaphes beckii</i>    | 0.1-0.2  | -    | 14        | 1         |
| Pimiento       | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>         | 0.1      | -    | 7         | 0.3       |
| Cebolla        | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2      | -    | 7         | 0.02      |
| Tomate         | Carapacha Mosquilla de los brotes | <i>Prodidiplos longifolia</i> | -        | 0.3  | 7         | 0.2       |
| Algodón        | Mosca blanca                      | <i>Bemisia tabaci</i>         | -        | 0.2  | 14        | 0.7       |
| Vid            | Chanchito harinoso                | <i>Planococcus citri</i>      | 0.15     | -    | 3         | 0.5       |
| Palma aceitera | Speathella                        | <i>Speathella tristis</i>     | 0.2-0.3  | -    | 21        | 0.01      |
| Arándano       | Trips                             | <i>Thrips tabaci</i>          | 0.2-0.25 | -    | 1         | 2         |

PC: Período de Carenza en días  
N.R.: No requerido. Valido solo para la etapa no productiva del cultivo, es decir, antes de la floración.  
LMR: Límite Máximo de Residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las andadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones instrucciones dadas.