

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoides.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano mostrándole la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, inducir al vómito solo si el paciente está conciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua con los párpados abiertos, remover los lentes de contacto si lo hubiera.
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y lavar la piel afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar al paciente al aire libre y dejarlo en reposo. Si respira con dificultad recurrir a un equipo de respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428
CICOTOX (01) 0800 – 1 – 3040 y
ESSALUD EN LÍNEA (01) 411 – 8000 / 0801 – 10200 (Las 24 Horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de protección para cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

JAKE 200 SL

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid.....200 g/l
Aditivos.....c.s.p.1 L

Registro PQUA N° 376 - SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.

ARIS
INDUSTRIAL

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima, Perú. - Telf.: 336 5428

FORMULADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD

Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO CHINA

No de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Contenido Neto : 200 L

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JAKE 200 SL es un insecticida Neonicotinoide, actúa por ingestión y contacto con actividad sistémica y translaminar. Actúa a nivel del sistema nervioso central de los insectos.

- Aplicar **JAKE 200 SL** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.
- Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.
- Aplicar JAKE 200 SL en mezcla máximo 24 horas después de preparado para evitar la degradación de la mezcla.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivos	Plaga		Dosis l/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mosquilla del brote	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	0.5	14	0.01

P.C.: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación. Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

