

QUIPON® 50 PM

F U N G I C I D A A G R Í C O L A

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química

Iprodione.....500 g/kg
Aditivos.....500 g/kg

REG. N° PQUA XXX-SENASA

CONTENIDO NETO: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Expiración:

Importado y Distribuido por:



QUIMICA SUIZA S.A.



Fabricado y Formuladopor:
Sinochem Ningbo LTD.
21 Jiangxia ST, NINGBO 315000
CHINA

Titular del Registro
Quimica Suiza S.A.
Av. República de Panamá 2577
Urb. Sta. Catalina
La Victoria - Lima - Perú
Telf.: 211-4000

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Moderadamente irritante para piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dicarboxiamidas

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, alejarlo de la zona contaminada y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón y solicite atención médica inmediata

NOTA AL MÉDICO

- Antídoto:** QUIPON® 50 PM no tiene antídoto específico. Debe seguirse un tratamiento sintomático.

- CICOTOX Telf.: 328-7398**
- ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4**
0801-10200 Opción 4
- QUIMICA SUIZA S.A. Telf.: 211-4000**

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, inutilice el envase cortándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO

QUIPON® 50 PM, es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.

QUIPON® 50 PM, es eficaz en el control de pudrición gris en el cultivo de vid.

Se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.).

Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
			Kg/cil. 200 L.	g/moch De 20 L.		
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	30	7	10

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

QUÍMICA SUIZA S.A. garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

