

Quipon[®] 50 PM

Quipon[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 433 - SENASA

Importado y Distribuido por:



Fabricado y Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia ST, NINGBO 315000
CHINA

Titular del Registro
QUIMICA SUÍZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Contenido Neto: 1 Kg

Lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Moderadamente irritante para piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Dicarboxiamidas

- En caso de ingestión llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. No inducir al vómito a menos que el médico lo indique. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, alejarlo de la zona contaminada y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón y en ambos casos solicite atención médica inmediata.

NOTA AL MÉDICO: Antídoto:
Quipon 50 PM no tiene antídoto específico. Debe seguirse un tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia

CICOTOX: 0800-1-3040
Aló EsSalud: 472-2300 (emergencia 24 horas)
Química Suiza Industrial del Perú S.A. 710-4000

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilice el envase cortándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Quipon 50 PM es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.
Quipon 50 PM es eficaz en el control de pudrición gris en el cultivo de vid.

Quipon 50 PM se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.). Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
			kg/aiL 200 L		
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	10

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

