

Quipon[®] 50 PM

Quipon[®] 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Iprodione 500 g/Kg
Aditivos C.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 433 - SENASA

Titular del Registro



Formulado por:
NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.
N° 1165 Beihai Road, Chemical Industry Zone 21 of Ningbo,
Zhenhai District, Zhejiang, China.

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Contenido Neto: 200 g
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilice el envase cortándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Quipon[®] 50 PM es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.

Quipon[®] 50 PM se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.). Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/ha, 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Ajo	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	14	0.2
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	14	0.02
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	7	0.2
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30-0.35		
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	1
Palto	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	14	0.02
Páprika	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	5
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	<i>Phoma exigua</i>	0.2	N.A.	0.02
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	10

PC: Período de Carenzia / LMR: Límite Máximo de Residuos

N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

