

Quipon[®] 50 PM

Quipon[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Iprodione500 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 433 - SENASA

Titular de Registro:



Fabricado y Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia ST, NINGBO 315000
CHINA

Importado y Distribuido por:
**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.**
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Contenido Neto: 0.2 Kg
Lote N°:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Quipon 50 PM es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.

Quipon 50 PM se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.). Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/cil. 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Ajo	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	14	0.2
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	14	0.02
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	7	0.2
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30-0.35		
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	1
Palto	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	14	0.02
Páprika	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	5
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	10

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Quipon[®] 50 PM

Quipon[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Iprodione500 g/Kg
Aditivosc.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 433 - SENASA

Titular de Registro:



Fabricado y Formulado por:
SINOCHEM AGRO CO., LTD.
17-19th Fl, N°33 He Nan Road(s)
Shanghai - China

Importado y Distribuido por:
**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL
DEL PERU S.A.**
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4000

Contenido Neto: 0.2 Kg
Lote N°:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Quipon 50 PM es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.

Quipon 50 PM se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.). Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (kg/cil. 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Ajo	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	14	0.2
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	14	0.02
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.4	7	0.2
	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.30-0.35		
Mandarina	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	1
Palto	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4	14	0.02
Páprika	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	5
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3	7	10

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

