

Quipon<sup>®</sup> 50 PM

Quipon<sup>®</sup> 50 PM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Iprodione ..... 500 g/Kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 433 - SENASA

Títular del Registro



Formulado por:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD.  
Room 10-6, Shidai Square N° 8, Lenging Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China

Contenido Neto: 500 g  
Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

Importado y Distribuido por:

SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577  
La Victoria, Lima - Perú  
Telef.: 710-4000

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilice el envase cortándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Quipon<sup>®</sup> 50 PM** es un fungicida de contacto con acción curativa y preventiva, perteneciente al grupo de las dicarboxiamidas; actúa inhibiendo la síntesis de DNA, la síntesis de proteínas, la biosíntesis de quitina, y reduce la biosíntesis de esteroides, lo que ocasiona una disminución en la división celular y el crecimiento micelial de los hongos.

**Quipon<sup>®</sup> 50 PM** se emplea en pulverizaciones con agua, aplicándose con cualquier equipo de aspersión terrestre (mochila manual, bomba a motor, parihuela, etc.). Para su preparación verter la dosis indicada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar y agregar el resto de agua.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| CULTIVO   | NOMBRE COMÚN                 | NOMBRE CIENTÍFICO           | DOSES<br>(kg/cil. 200 L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Ajo       | Podredumbre blanca           | <i>Sclerotium cepivorum</i> | 0.4                      | 14           | 0.2          |
| Alcachofa | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.5                      | 14           | 0.02         |
| Cebolla   | Podredumbre blanca           | <i>Sclerotium cepivorum</i> | 0.4                      | 7            | 0.2          |
|           | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.30-0.35                |              |              |
| Mandarina | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.3                      | 7            | 1            |
| Palto     | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.4                      | 14           | 0.02         |
| Páprika   | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.3                      | 7            | 5            |
| Quinua    | Podredumbre marrón del tallo | <i>Phoma exigua</i>         | 0.2                      | N.A          | 0.02         |
| Vid       | Pudrición gris               | <i>Botrytis cinerea</i>     | 0.3                      | 7            | 10           |

PC: Período de Carenzia / LMR: Límite Máximo de Residuos

N.A: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto dirigido al follaje, al inicio de la infección. Se recomienda 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

