

Ø 27.94 cm

27.50 cm

Adhesivos del Norte S.A.C.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: anilínopirimidinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **Teléfonos de emergencia:** CISPROMQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.
- Nota al médico. En caso de ingestión realizar un lavado gástrico. Si la intoxicación es por inhalación y el paciente no respira, proporcionar respiración artificial.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No reutilizar los envases vacíos ni tampoco enterrarlos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para el ganado.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zona con napa freática superficial o suelo altamente permeable.

Tribut®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Pyrimethanil 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 443-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Formulado por:

NINGBO FREE TRADE ZONE FINECHEM IND. CO., LTD.
701-2 Golden Shore, No. 146 Huaishu Road, Ningbo 315020, China.
Tel.: 0086-574-87641888. Fax: 0086-574-87641880.

Importado y Distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERÚ
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Contenido Neto : 1 L

Nº de Lote :

"VER PARTE
SUPERIOR"

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

©Marca registrada de Farmex S.A.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TRIBUT es un fungicida de contacto y con acción translaminar, que actúa como protectante y curativo de penetración.

TRIBUT actúa como un inhibidor de la biosíntesis de la metionina, que a su vez inhibe la secreción de las enzimas producidas por los hongos y que son relevantes para iniciar la infección.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(mL/cil)	(L/ha)		
Alcachofa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250	--	3	0.05
Fresa	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	--	3	5
Mandarina	Podredumbre gris de la flor	<i>Botrytis cinerea</i>	200	--	21	10
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	1 - 1.5*	21	4

PC: período de carencia (días); LMR: límite máximo de residuos (ppm).

* Volumen de aplicación 1000 - 1500 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para todos los cultivos se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña, considerando solo una campaña por año y con un intervalo mínimo de 14 días entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción muy alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe corregir el pH del agua y probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

TRIBUT no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis y en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



06-10-18

2001516 - Tribut® x 1 Lt V4

0.5 cm

0.5 cm