



**PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE - PS**

**COMPOSICIÓN:**

Acephate.....70g/Kg

Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

**Registro PQUA N° 442 – SENASA**  
**Titular de registro Aris Industrial S.A**

**FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO.,LTD**  
Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG  
PROVINCE, CHINA.  
Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO CHINA



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A**  
AV. INDUSTRIAL 491, LIMA. PERÚ. - Telf: 336 5428

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 1 Kg

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Organofosforado-
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión beber uno o dos vasos de agua e inducir al vómito. Contactar con un centro toxicológico y acudir al médico inmediatamente.
- En caso de inhalación llevar a la persona a un área fresca, ventilada, si la persona no respira proporcionar respiración artificial. Buscar atención médica.
- Antídotos: No hay antídoto específico disponible. Realizar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a;

ARIS INDUSTRIAL S. A. (01) 336 5428 CISPROMQUIM: 0800-50847  
CETOX: (01)273-2318 ó 999072933 ESSALUD: 117

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos en estado larval y adultos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora o fauna silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RÁFAGA 75 PS** es un insecticida sistémico que actúa principalmente por ingestión y/o contacto, inhibiendo la acción de la enzima acetilcolinesterasa.

La preparación de la mezcla se realiza en la mitad del agua, se deja caer el contenido en el tanque de preparación, se agita bien y se completa al volumen requerido. No adicionar ningún adyuvante hasta que el contenido esté disuelto completamente.

**RÁFAGA 75 PS** puede ser aplicado en cualquier equipo de aspersión terrestre.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Enfermedad       |                              | Dosis   |       | P.C<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|------------------|------------------------------|---------|-------|---------------|--------------|
|         | Nombre común     | Nombre científico            | Kg./Cil | Kg/Ha |               |              |
| Maíz    | Gusano cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.3     | 0.9   | 7             | 0.02         |

P.C.: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda máximo 3 aplicaciones por campaña, a la aparición de las primeras larvas en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**RÁFAGA 75 PS** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una premezcla.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

