



del producto.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes.

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

producto.

información comunicarse con el titular de registro o con el distribuidor del

de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor

etiqueta y que es eficaz para fines aquí recomendados, si se usa y maneja

producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del

RESPONSABILIDAD CIVIL:

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo

a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD

No se debe mezclar con fungicidas. Es compatible con insecticidas, herbicidas

y fertilizantes.

COMPATIBILIDAD:

No establecido por ser un producto biológico

PERIODO DE REINGRESO

raíces.

Cacao: 1 a 2 aplicaciones durante la campaña/año, durante el desarrollo de

Arándano: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones con intervalo de 15 días

por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.

Pato: durante el desarrollo de raíces, 2 a 3 aplicaciones por campaña/año

de acuerdo a la severidad de la enfermedad.

Alcachofa: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones por campaña/año de

Cebolla y papa: luego de la siembra, 1 aplicación por campaña/año.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO						
Cultivo	Plaga		Nombre científico	Dosis (Kg/ha)	P.C. (dias)	LMR (ppm)
	Nombre común					
Arándano	Podredumbre Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.6	NA	NA	
	Alcachofa	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.3	NA	NA
Cebolla	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.3	NA	NA	
		<i>Monophophthora rorei</i>	0.3	NA	NA	
Pato	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.6	NA	NA	
		<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6	NA	NA	
Papa	Chupada Fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1	NA	NA	

LMR: Límite Máximo de Residuos. PC: Periodo de Carenia. NA: No Aplica

planta y que el terreno esté en capacidad de campo.

- En arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.
- En pato y cacao: en drench a la altura de copa o en pulverización al pie de planta en cambio de surco.
- En alcachofa: en chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta en cambio de surco.
- En cebolla y papa: en drench al pie de planta, cuando el terreno esté a capacidad de campo.
- En alcachofa: en chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta en cambio de surco.
- En pato y cacao: en drench a la altura de copa o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.
- En arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*1 x 10⁸ esporas viables/g

Aditivos csp 1 g

PEUA N° 036 – SENASA

Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Importado y Distribuido por:
Serfi S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

Formulado por:
ORIUS BIOTECH S.A.S
Carrera 23 #5 - 86, Alborada,
Villavicencio, Colombia
Teléfono +57 8 6700472

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Tricho D, no es tóxico para el hombre y animales, aún así debe tenerse cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Usar guantes, máscaras, botas de jebe, mamelucos.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico o lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

SERFI: 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

PRECAUCIÓN



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone
355 C

Pantone
293 C

Negro
Proceso