



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Cebolla y papa: luego de la siembra, 1 aplicación por campaña/año.
Alcachofa: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.
Patito: durante el desarrollo de raíces, 2 a 3 aplicaciones por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.
Ardandano: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones con intervalo de 15 días por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.
Cacao: 1 a 2 aplicaciones durante la campaña/año, durante el desarrollo de raíces.
PERIODO DE REINGRESO
No establecido por ser un producto biológico
COMPATIBILIDAD
No se debe mezclar con fungicidas. Es compatible con insecticidas, herbicidas y fertilizantes.
FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO						
TrichoD-WP es un Fungicida Agrícola, antagonista de fitopatógeno que dañan las raíces y la planta; bloquea la acción de los fitopatógenos en el suelo en las raíces para lograr un suelo y cultivo sano.						
TrichoD-WP es un fungicida biológico a base de esporas en latencia del hongo benéfico <i>Trichoderma harzianum</i> , el cual produce enzimas degradadoras de la pared celular de los hongos causantes de enfermedades radiculares. TrichoD-WP actúa por competencia al desarrollarse primero en el sustrato, por antagonismo al inhibir la germinación de las esporas y parasitismo al impedir el desarrollo de los microorganismos fitopatógenos. Por su naturaleza TrichoD-WP puede ser incluido dentro del Manejo Integrado de los cultivos, así como en la Agricultura orgánica.						
TrichoD-WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua limpia a pH 5. Luego agregar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido. Se debe agitar hasta obtener una mezcla homogénea.						
TrichoD-WP se aplica por sistema de riego presurizado y en el caso de riego por gravedad: En cebolla y papa: en drench al pie de planta, cuando el terreno esté a capacidad de campo. En alcachofa: en chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta en cambio de surco. En patito y cacao: en drench a la altura de copa o en la poza de riego. En arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.						
CONSULTA CON UN INGENIERO AGRÓNOMO						
Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis (Kg/ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)	
	Plaga					
Alcachofa	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.3	NA	NA	
	Podredumbre Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.6	NA	NA	
	Moniliosis	<i>Monilophthora rorei</i>	0.3	NA	NA	
	Rebolla	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.3	NA	NA
	Patito	Moerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.6	NA	NA
	Papa	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.6	NA	NA
	Papa	Chupadera Fungosa	<i>Rhizoctonia solani</i>	1	NA	NA
	LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia NA: No Aplica					

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición
Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*1 x 10⁸ esporas viables/g
Aditivos csp 1 g

PBUA N° 036 – SENASA
Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Importado y Distribuido por:

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono: 710-4068

Formulado por:

Calle 23 # 5-86, Alborada,
Villavicencio, Colombia
Teléfono: + 57 8 6700472
www.oriusbiotech.com

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Tricho D, no causa molestias en humanos ni en animales, aun así debe tenerse cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:
- Leer detenidamente la etiqueta.
- Usar guantes, máscaras, botas de jebe, mamelucos.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de ingestión se recomienda seguir un tratamiento sintomático. Si persiste, llevar la persona al médico y entregar la etiqueta.
- Si hay contacto prolongado con la piel, retirar la ropa que tuvo contacto con el producto, lavar el área expuesta con suficiente agua y jabón.
- Si hay contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua limpia. Si la irritación persiste, llevar al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SERFI: (01) 710-4068

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

PRECAUCIÓN



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone
355 C

Pantone
293 C

Negro
Proceso