



- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes  
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a la dosis recomendada.

#### FITOTOXICIDAD

No se debe mezclar con insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Es compatible con fungicidas, desinfectantes, ácidos y bases fuertes.

#### COMPATIBILIDAD

No establecido por ser un producto biológico

#### PERIODO DE REINGRESO

raíces.  
Cacao: 1 a 2 aplicaciones durante la campaña/año, durante el desarrollo de por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.  
Arándano: durante el desarrollo de raíces, 2 a 3 aplicaciones con intervalo de 15 días de acuerdo a la severidad de la enfermedad.  
Palto: durante el desarrollo de raíces, 2 a 3 aplicaciones por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.  
Alcachofa: durante el desarrollo de raíces, 1 a 2 aplicaciones por campaña/año de acuerdo a la severidad de la enfermedad.  
Cebolla y papa: luego de la siembra, 1 aplicación por campaña/año.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

| Cultivo   | Nombre común          |                                 | Nombre científico | Dosis (kg/ha) | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
|           | Plaga                 |                                 |                   |               |             |           |
| Alcachofa | Podredumbre Radicular | <i>Fusarium oxysporum</i>       | 0.3               | NA            | NA          | NA        |
| Arándano  | Podredumbre Radicular | <i>Phytophthora cinnamomi</i>   | 0.6               | NA            | NA          | NA        |
| Cacao     | Moniliasis            | <i>Monilophthora roerei</i>     | 0.3               | NA            | NA          | NA        |
| Cebolla   | Podrición Radicular   | <i>Fusarium oxysporum</i>       | 0.3               | NA            | NA          | NA        |
| Palto     | Muerte regresiva      | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 0.6               | NA            | NA          | NA        |
|           | Podrición Radicular   | <i>Phytophthora cinnamomi</i>   | 0.6               | NA            | NA          | NA        |
| Papa      | Chupadera Fungosa     | <i>Rhizoctonia solani</i>       | 1                 | NA            | NA          | NA        |

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carenia NA: No Aplica

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

el terreno esté en capacidad de campo.

- En arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que

- En palto y cacao: en drench a la altura de copa o en la poza de riego.

- En alcachofa: en chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta en

- En cebolla y papa: en drench al pie de planta, cuando el terreno esté a capacidad de

- En cebolla y papa: en drench al pie de planta, cuando el terreno esté a capacidad de

campo.

TRICHO D se aplica por sistema de riego presurizado y en el caso de riego por gravedad:

requerido. Se debe agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

Luego agregar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen

TRICHO D se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua limpia

MODO DE EMPLEO:

dentro del Manejo Integrado de los cultivos así como en la Agricultura Orgánica.

También actúa como acondicionador del suelo y bioestimulante. TRICHO D puede ser incluido

que dañan las raíces y la planta, mejora la formación radicular, bloquea la acción de las

TRICHO D es un fungicida biológico, que actúa como antagonista de varios problemas en el suelo

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### "LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

#### "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

TRICHO D, no causa molestias en humanos ni en animales, aun así debe tenerse cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Usar guantes, máscaras, botas de jebe, mamelucos.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión se recomienda seguir un tratamiento sintomático. Si persiste, llevar la persona al médico y entregar la etiqueta.
- Si hay contacto prolongado con la piel, retirar la ropa que tuvo contacto con el producto, lavar el área expuesta con suficiente agua y jabón.
- Si hay contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua limpia. Si la irritación persiste, llevar al médico.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

ORIOUS BIOTECH PERU SAC: +51 919 495 585

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

#### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### POLVO MOJABLE (WP)

#### Composición

*Trichoderma harzianum* ..... 1 x 10<sup>8</sup> esporas viables/g  
Aditivos ..... csp 1 g

PBUA N° 036 – SENASA

Titular del Registro: ORIOUS BIOTECH PERU SAC

#### Formulado por:

**ORIOUS BIOTECH**  
Calle 23 # 5-86, Alborada,  
Villavicencio, Colombia  
Teléfono: + 57 8 6700472  
www.oriusbitech.com

#### Importado y Distribuido por:

**ORIOUS BIOTECH PERU**  
Calle Mártir José Olaya N° 129-Interior 1101  
Miraflores, Lima-Perú  
+51 919 495 585

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

#### PRECAUCIÓN

