

Tamaño: 30 x 10 cms 11.05.18

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Tricho D, no es tóxico para el hombre y animales, aún así debe tenerse cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:

- Leer detenidamente la etiqueta.
- Usar guantes, máscaras, botas de jebe, mamelucos.
- Evitar contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse y bañarse con abundante agua y jabón.
- Evítese la contaminación de las fuentes de agua, estanques y drenajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión llame al médico o lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto, elimine la contaminación dérmica con agua y jabón.
- Trate la contaminación ocular con enjuagues de agua.

Teléfonos de emergencia:

CETOX: 0800 71911
ESSLUD: 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, hacer el tripe lavado, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.



Importado por:

Serfi S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4000

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición

Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*1 x 10⁸ esporas viables/g
Aditivos csp 1 g

PBUA N° 036 – SENASA
Titular del Registro: Serfi S.A.

Formulado por:

ORIUS BIOTECNOLOGIA LTDA
Cra 23 #5 - 86, Barrio La Alborada,
Villavicencio, Meta, Colombia

CONTENIDO NETO: 300 gr

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tricho D es un fungicida biológico a base de esporas del hongo benéfico *Trichoderma harzianum*, el cual compite con los hongos causantes de las enfermedades radiculares en los cultivos a fin de desarrollarse primero en el sustrato y a su vez es parásito de los hongos fitopatógenos impidiendo el desarrollo de los hongos como: *Fusarium oxysporum* en el cultivo de alcachofa y cebolla; *Phytophthora cinnamomi* y *Lasiodiplodia theobromae* en palto. Por su naturaleza **Tricho D** puede ser incluido dentro del Manejo Integrado de los Cultivos, así como en la Agricultura orgánica.

Tricho D se aplica por el sistema de riego presurizado y en el caso de riego por gravedad:

- En cebolla: en pulverización al pie de planta.
- En alcachofa. En chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta a cambio de surco.
- Palto: en drench a la altura de copa o en la poza de riego.
- Arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	Dosis /ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	300 g	NA	NA
Arándano	Podredumbre radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	600 g	NA	NA
Cebolla	Pudrición Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	300 g	NA	NA
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	600 g	NA	NA
	Pudrición Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	600 g	NA	NA

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia NA: No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Cebolla: luego de la siembra, 1 aplicación por campaña
Alcachofa: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones por campaña de acuerdo a la severidad de la enfermedad.
Palto: durante desarrollo de raíces, 2 a 3 aplicaciones por campaña de acuerdo a la severidad de la enfermedad.
Arándano: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones con intervalo de 15 días por campaña de acuerdo a la severidad de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No establecido por ser un producto biológico

COMPATIBILIDAD:

No se debe mezclar con fungicidas. Es compatible con insecticidas, herbicidas y fertilizantes.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

