

Cultivo	Enfermedad	Agente Causal	Dosis / ha (dias)	P.C. (dias)	LMR (ppm)
Alcachofa	Putridión Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	300 g	NA	NA
Arañano	Podredumbre Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	600 g	NA	NA
Cacao	Moniliasis	<i>Moniliophthora roerei</i>	300 g	NA	NA
Cebolla	Putridión Radicular	<i>Fusarium oxysporum</i>	300 g	NA	NA
Palo	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	600 g	NA	NA
	Putridión Radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	600 g	NA	NA

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

- **Tiñichito D** se aplica por el sistema de riego presurizado y en el caso de riego por gravedad:
- En cebolla: en pulverización al pie de planta.
- En alcachofa. En chorro en el hoyo de trasplante o en pulverización al pie de planta a cambio de surco.
- Pato: en drencha a la altura de copa o en la poza de riego.
- Arándano: en chorro en el hoyo de trasplante, o en pulverización al pie de planta y que el terreno esté en capacidad de campo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Trich D es un fungicida biológico a base de esporas del hongo benéfico *Trichoderma harzianum*, el cual compete con los hongos causantes de las enfermedades radiculares en los cultivos a fin de desarrollarse primero en el desarrollo de los hongos como: *Fusarium oxysporum* en el cultivo de alcañal y cebolla; *Phytophthora cinnamomi* y *Lasiodiplodia theobromae* en el cultivo de los cultivos, así como en la Agricultura orgánica.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y se maneja de

RESPONSABILIDAD SOCIAL

No es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD

No se debe mezclar con fungicidas. Es compatible con insecticidas, herbicidas y fertilizantes.

COMPATIBILIDAD:

No establecido por ser un producto biológico

PERIODO DE REINGRESO

por campaña de acuerdo a la severidad de la enfermedad.

Arándano: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones con intervalo de 15 días

acuerdo a la severidad de la enfermedad.

Alcachofa: durante el trasplante, 1 a 2 aplicaciones por campaña de

Cebolla: luego de la siembra, 1 aplicación por campaña

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN



FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Ingrediente activo: *Trichoderma harzianum*1 x 10⁸ esporas viables/g
Aditivos csp 1 g

PBUA N° 036 – SENASA

Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Importado por:

Serfi S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 710-4068

Formulado por:

ORIOUS BIOTECH S.A.S
Carrera 23 #5 - 86, Alborada,
Villavicencio, Colombia
Teléfono +57 8 6700472

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN



MV PRODUCCIONES GRAFICAS

Pantone
355 C

Pantone
293 C

Negro Proceso