

ADAMA

# Momentum<sup>®</sup>

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES(WG)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Fosetyl-Al ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p.1Kg

Reg. PQUA N° 446 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.  
Miraflores. Lima - Perú.  
Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd**  
P.O. Box 60,  
Beer Sheva 8410001. Israel.

CONTENIDO NETO: **1 Kilogramo**

Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

Dimensiones 210 mm x 150 mm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada si el producto aún no ha secado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en su envase original bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: ETHYL PHOSPHONATOS
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente esta inconsciente. Lavar la boca con abundante agua. Buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua tibia y jabón.
- NOTA AL MÉDICO: Realizar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
**CISPROQUIM: 0800-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828**  
**CICOTOX : 0800-13040**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano en las mañanas, muy tarde o en las noches, evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**MOMENTUM** es un fungicida altamente sistémico con acción preventiva y curativa.

Mezclar en un balde la cantidad requerida de **MOMENTUM** con un poco de agua. Adicionar más agua y mezclar de nuevo. Transferir la mezcla al tanque de aplicación con el volumen de agua recomendado. El agitador del tanque debe permanecer en movimiento durante la aplicación.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ha		
CEBOLLA	Mildiu ( <i>Peronospora destructor</i> )	0.75 - 1.0	3.5 - 5.0*	7	0.5
MANDARINA	Podredumbre radicular ( <i>Phytophthora parasitica</i> )	0.5	-	14	75
PALTO	Podredumbre radicular ( <i>Phytophthora cinnamomi</i> )	0.50 - 0.75	-	14	50

\*Dosis estimada para un volumen de agua por hectárea de 1000 litros  
 LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Periodo de Carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

CULTIVO	Nº Aplicaciones por campaña	Intervalo (días)	Nº Campañas por año
CEBOLLA	3	7 - 14	1
MANDARINA	2	45	1
PALTO	2	60	1

Intervalo: Número de días mínimo entre aplicaciones

**PERIODO DE REINGRESO:**

12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No es compatible con productos a base de cobre, de reacción alcalina, aceites emulsionables y fertilizantes foliares.

**FITOTOXICIDAD:**

Puede ocurrir fitotoxicidad si productos que contienen cobre son mezclados con productos formulados a base de fosetyl-Al o si soluciones conteniendo fosetyl-Al (cuyo pH no ha sido regulado) son aplicadas sobre follaje que tiene residuos de cobre.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



Dimensiones 210 mm x 150 mm