

ADAMA

Momentum®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULOS DISPERSABLES(WG)

COMPOSICIÓN:
Fosetyl-Al 800 g/kg
Aditivos c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA N° 446 - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of. 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60,
Beer Sheva 8410001. Israel.

Contenido Neto: 1 Kilogramo

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Cara

Dimensiones 210 mm x 150 mm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar el contacto con la piel y ropa.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada si el producto aún no ha secado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.
- No comer, no beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en su envase original bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar en casa habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: ETHYL PHOSPHONATOS
- En caso de inhalación, sacar a la víctima al aire libre. Si la respiración es dificultosa dar oxígeno.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente esta inconsciente. Lavar la boca con abundante agua. Buscar ayuda médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua tibia y jabón.
- NOTA AL MÉDICO: Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: (01) 328-7700; INFOSALUD: 0800-10828
CISPROQUIM: 0800-050847; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas.
- Aplicar temprano en las mañanas, muy tarde o en las noches, evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MOMENTUM es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Mezclar en un balde la cantidad requerida de MOMENTUM con un poco de agua. Adicionar más agua y mezclar de nuevo. Transferir la mezcla al tanque de aplicación con el volumen de agua recomendado. El agitador del tanque debe permanecer en movimiento durante la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ha		
CEBOLLA	Mildiu (Peronospora destructor)	0.75 - 1.0	3.5 - 5.0*	7	0.5
MANDARINA	Podredumbre radicular (Phytophthora parasitica)	0.50	-	14	75
PALTO	Podredumbre radicular (Phytophthora cinnamomi)	0.50 - 0.75	-	14	50
PIMIENTO	Podredumbre radicular (Phytophthora capsici)	-	1.5 - 2.0	3	130
VID	Mildiu (Plasmopara viticola)	0.5	-	15	10
	Hongo de Madera (Cylindrocarpon obtusisporum)	1.0	-		

*Dosis estimada para un volumen de agua por hectárea de 1000 litros
LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad o de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

CULTIVO	N° Aplic/ campana	Intervalo (días)	CULTIVO	N° Aplic/ campana	Intervalo (días)
CEBOLLA	3	7 - 14	PALTO	2	60
MANDARINA	2	45	PIMIENTO	2	30
VID (Mildiu)	2	15	VID (Hongo de Madera)	1	-

Intervalo: Número de días mínimo entre aplicaciones
Considerar una (01) solo campaña por año para todos los cultivos

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos a base de cobre, de reacción alcalina, aceites emulsionables y fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD:

Puede ocurrir fitotoxicidad si productos que contienen cobre son mezclados con productos formulados a base de fosetyl-Al o si soluciones conteniendo fosetyl-Al (cuyo pH no ha sido regulado) son aplicadas sobre follaje que tiene residuos de cobre.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



Contracara