



Trivia[®] 727 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Propineb, 667 g/kg
Fluopicolide, 60 g/kg
Aditivos, 273 g/kg

Reg. PQUA N° 357-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá DC - Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

**Contenido
Neto: 500 g**

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.
- No se debe comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y luego lavar la ropa contaminada.
- Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugares frescos y secos alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupos químicos:
Propineb = Ditiocarbamatos
Fluopicolide = Benzamida piridina.
- En caso de ingestión no inducir al vómito si el paciente está inconsciente. Lleve al médico.
- En caso de contaminación por piel, quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico.
- En caso de contaminación en ojos, lave el ojo afectado con agua limpia por mínimo 15 minutos, cubra el ojo y acuda al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire a la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:

Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático. No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROMQUIM: 0800-50847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Trivia 727 PM es un fungicida formado por dos ingredientes activos complementarios Fluopicolide y Propineb. Fluopicolide actúa en proteínas específicas esenciales en las interacciones entre la membrana y el citoesqueleto mientras que propineb posee un efecto multisitio.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Preparar la mezcla según la dosis en etiqueta en un volumen reducido de agua agitando completamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

En zonas endémicas para el cultivo de papa aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo 3 aplicaciones por campaña al año, considerando una sola campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO:

12 horas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos químicos de uso agrícola, sin embargo es conveniente previo a hacer la mezcla corroborar la compatibilidad entre ambos productos.

FITOTOXICIDAD:

No presenta fitotoxicidad con los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones y dosis establecidas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS*			LMR (ppm)	PC (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	%	g/cil.	Kg/ha		
PAPA	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.2-0.3	400-600	1 -1,5	Propineb: 0.1 Fluopicolide: 0.02	14
VID	Plasmopara	<i>Plasmopara viticola</i>	0.25	--	--	Propineb: 5 Fluopicolide: 2	30

PC = Período de carencia(días) LMR = Límite máximo de residuos (ppm)

***En el caso de papa, en zonas de alta incidencia de la enfermedad utilizar la dosis más alta recomendada.**

Emplear la dosis en porcentaje (%) o g/cilindro cuando se use pulverizadora manual. Emplear la dosis en kg/ha, previa calibración del gasto de agua por Ha para aplicaciones con tractor o mochila a motor.

