

Argos 60 wp

HERBICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Metsulfuron methyl..... 600 g/kg

Aditivos..... 400 g/kg

Reg. PQUA N°

CONTENIDO NETO:10g

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

TITULAR DE REGISTRO:

PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristan 463 Oficina 201- La Molina. Lima, Perú

Teléfono: 3481018

Fabricante:


POINT AGRO-CHINA Ltd

1505-1506 Diamond Business Centre

Nanxing Street, Hangzhou

China

Importado y Distribuido por:



NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico : Sulfonilureas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Contacto ocular: lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia o solución salina en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.
- Contacto dermal: quitar la ropa y lavar la piel, los cabellos con agua y jabón sin frotar.
- Inhalación : retirar a la persona de la zona contaminada y trasladarla a un lugar bien ventilado.
- Ingestión : No administrar nada por vía oral; en caso de ingestión si la persona esta consciente provocar el vomito

NOTA AL MEDICO: tratamiento sintomático.
 Antídoto : no tiene.

Teléfonos de emergencia:
 CICOTOX: 0800-1-3040.
 ESSALUD EN LINEA: 4118000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INDICATIVOS DE USO

ARGOS 60 WP es un herbicida sistémico, perteneciente al grupo de las Sulfonilureas, de absorción foliar y radicular.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Lenar el tanque con agua hasta la mitad, luego diluya la dosis indicada y complete con agua hasta alcanzar el volumen total, agite y proceda a aplicar. La aplicación se puede hacer con cualquier equipo de aspersión, manual o mecánico y con boquilla para herbicidas de buena cobertura, tratando de hacer una aplicación uniforme. Hacer las aplicaciones por las mañanas (poco viento) para evitar la contaminación de cultivos vecinos.

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS g/Ha	P.C. (Días)	L.M.R. (ppm)
	Técnico	Común			
Caña de azúcar	<i>Nicandra physaloides</i>	Capulí	8	30	0.05
	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	8		
	<i>Chenopodium album</i>	Quinoa silvestre	8		
	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba del gallinazo	8		
	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	8		
	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	8		
	<i>Brassica campestris</i>	Nabo silvestre	8		
	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	8		
	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	8		

P.C.= Período de carencia. L.M.R. = Límite máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El producto debe ser aplicado en post-emergencia temprana al cultivo (desde que presenta de 4 a 5 hojas hasta antes de la etapa de embuche) y a la maleza (no debe de sobrepasarse los 10 cm de altura). Se recomienda una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda aplicar **ARGOS 60 WP** solo. Es decir no realizar mezcla con otros plaguicidas. No compatible con fertilizantes.

FITOTOXICIDAD:

ARGOS 60 WP no es fitotóxico al cultivo de caña de azúcar.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

