

9,0 ± 0,2

12,4 ± 0,2

2.0

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"



INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

(*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*)



INDICATIVOS DE USO

FINALL 40 WP es un insecticida producido por la bacteria *Bacillus thuringiensis* durante su esporulación, con acción letal para larvas de Lepidópteros en varios cultivos. **FINALL 40 WP** actúa por ingestión . Poco tiempo después de ingerirlos las larvas dejan de alimentarse, permaneciendo vivas aunque sin causar daños. La muerte de las larvas puede producirse entre las 48 y 72 horas después de la aplicación.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

FINALL 40 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila o palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en el cultivo (Larvas de 1º y 2º estadio).
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 10 - 12 días después de la primera.
- Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD

FINALL 40 WP es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; excepto con materiales alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

CUADRO DE DOSIFICACIONES

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/ha	g/cil 200 L		
ESPARRAGO	Gusano Ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	600	250	No existen restricciones en la aplicación de FINALL 40 WP	—

LMR.: Límite Máximo de Residuos

PC.: Periodo de carencia

**“DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUES DE USAR EL PRODUCTO”**



PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

FINALL 40 WP es un insecticida biológico de uso agrícola LIGERAMENTE TÓXICO; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomarse las siguientes medidas de precaución:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Conservarse el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **Antídoto:** No requiere.

NOTA AL MÉDICO

Ligeramente tóxico
DL oral: > 2000 mg/kg
DL dermal: > 1000 mg/kg
CL inhalatoria: > 5.0 mg/l

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

NOTAAL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES”

