

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA
DE ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de intoxicación accidental llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106. HORTUS S.A.: (01) 748-2717.



Contenido neto : 500 ml
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

DALAC 400SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Pyrimethanil 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 409 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú

Formulado por:



Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North
Jianguo Road,
Hangzhou 310004 - CHINA

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Telf.: (01) 748-2717
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DALAC 400SC es un fungicida que actúa inhibiendo la biosíntesis de la metionina, lo que lleva a una inhibición de las secreciones necesarias para causar infección. Controla tanto preventiva como curativamente.

Utilice un mojado adecuado para lograr una buena cobertura y efectividad del fungicida. Agitar el producto antes de usarlo. Para preparar la solución, se deberá llenar el tanque de agua a la mitad. Luego, agregar la cantidad necesaria de DALAC 400SC, de acuerdo a dosis de la etiqueta manteniendo las paletas de agitación en movimiento, luego completar el tanque hasta el nivel deseado. Lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	ENFERMEDAD		DOSIS ml/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	100 - 200	67	4
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	72	0.05
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	21	10
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	125	7	3
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	150 - 250	0	15
Caqui	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	1	15
Pitahaya	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	13	0.01

PC: Período de Carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

