

15 cm

kraken®

INSECTICIDA AGRICOLA
Polvo Mojable (WP)
Composición Química:

Imidacloprid..... 420 g/Kg

Lambda cyhalothrin..... 60 g/Kg

Aditivos c.s.p..... 1 Kg

Registro: PQUA N° 458 - SENASA
Lote No:
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
CONTENIDO NETO: 250 g


SINOCHEN NINGBO LTD.

FORMULADO POR:
 SINOCHEN NINGBO
 CHEMICALS CO. LTD.
 21Jiangxia St.
 Ningbo Province,
 China

INTEROC @ CUSTER
TITULAR DE REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
 INTEROC S.A.
 Av. La Molina N°2830. Tda B-17/2,
 Mz. D. Lt.02, Urb. El Sauce de
 La Rinconada.Lima - Perú

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO
“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y preparación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua. En caso de inhalación lleve a la víctima al aire fresco. Síntomas de intoxicación por IMIDACLOPRID incluyen irritación ocular y dérmica, fatiga, debilidad muscular. Tratar sintomáticamente, no hay antídoto específico. Síntomas de intoxicación por LAMBDA CYHALOTHRIN incluyen irritación en la piel, no hay antídoto específico, se recomienda dar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta. Para emergencias comuníquese a: CICOTOX (LÍNEA GRATUITA 24 horas) 0800-1-3040. Mayor información llamar a INTEROC S.A. (511) 243 2233.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Después de usar el contenido y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, perforándolo, y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE: No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO: calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de KRAKEN de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO
CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/cil	Kg/Ha		
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	“Mosquilla” o “Caracha”	<i>Prodiplosis longifila</i>	250	0.5	7	Imidacloprid: 0.05 Lambda cyhalothrin: 0.002
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	“Mosquilla” o “Caracha”	<i>Prodiplosis longifila</i>	150 - 200	--	15	Imidacloprid: 0.5 Lambda cyhalothrin: 0.02
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	“Mosquilla” o “Caracha”	<i>Prodiplosis longifila</i>	150 - 200	--	7	Imidacloprid: 1 Lambda cyhalothrin: 0.1

PC: Periodo de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año cuando se note la presencia de la plaga en el campo.

FECHA DE REINGRESO: 24 horas

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: se recomienda hacer prueba de campo.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



22,5 cm