

22.5 cm

15 cm

# kraken®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

Imidacloprid ..... 420 g/Kg  
Lambda cyhalothrin ..... 60 g/Kg  
Aditivos ..... csp 1Kg

PQUA N° 458 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: (511) 614-5100  
Lima - Perú

Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido Neto : 250 g  
Fecha de Vencimiento :



SINOCHEM NINGBO LTD.

Formulador:  
SINOCHEM NINGBO  
CHEMICALS CO., LTD  
21 Jiangxia St.  
Ningbo Province, China

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

15 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y preparación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo, vapor o aspersión. Causa irritación moderada a los ojos.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Imidacloprid (Neonicotinoide) y Lambda cyhalothrin (Piretroide)  
En caso de contacto con los ojos y piel lave con abundante agua. En caso de inhalación lleve a la víctima al aire fresco. Síntomas de intoxicación por IMIDACLOPRID incluyen irritación ocular y dérmica, fatiga, debilidad muscular. Tratar sintomáticamente, no hay antídoto específico. Síntomas de intoxicación por LAMBDA CYHALOTHRIN incluyen irritación en la piel, no hay antídoto específico, se recomienda dar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**  
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)  
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, perforándolo, y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. Peligroso para organismos acuáticos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **KRAKEN®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año cuando se note la presencia de la plaga en el campo.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas

**COMPATIBILIDAD:** Se recomienda hacer prueba de campo.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO                                       | PLAGA                                      |                                              | DOSIS          |       | PC (días) | LMR (ppm)                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----------|---------------------------------------------|
|                                               | NOMBRE COMÚN                               | NOMBRE CIENTÍFICO                            | Kg/cil de 200L | Kg/Ha |           |                                             |
| Espárrago<br>( <i>Asparagus officinalis</i> ) | “Caracha<br>(mosquilla de los brotes)”     | <i>Prodiplosis longifila</i>                 | 0.25           | 0.5   | 7         | 0.05 <sup>(1)</sup><br>0.002 <sup>(2)</sup> |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> )          | “Caracha<br>(mosquilla de los brotes)”     | <i>Prodiplosis longifila</i>                 | 0.15 - 0.20    | --    | 15        | 0.5 <sup>(1)</sup><br>0.02 <sup>(2)</sup>   |
| Sandía<br>( <i>Citrullus lanatus</i> )        | “Mosca blanca”                             | <i>Bemisia tabaci</i>                        | 0.15 - 0.20    | --    | 7         | 0.2 <sup>(1)</sup><br>0.05 <sup>(2)</sup>   |
| Pimiento<br>( <i>Capsicum annuum</i> )        | “Caracha<br>(mosquilla de los brotes)”     | <i>Prodiplosis longifila</i>                 | 0.15 - 0.20    | --    | 7         | 1 <sup>(1)</sup><br>0.1 <sup>(2)</sup>      |
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> )              | “Mosca minadora del arroz”                 | <i>Hydrellia wirthi</i>                      | 0.15 - 0.20    | --    | 45        | 1.5 <sup>(1)</sup><br>1 <sup>(2)</sup>      |
| Tomate<br>( <i>Lycopersicon esculentum</i> )  | “Caracha<br>(mosquilla de los brotes)”     | <i>Prodiplosis longifila</i>                 | 0.15 - 0.20    | --    | 14        | 0.5 <sup>(1)</sup><br>0.1 <sup>(2)</sup>    |
| Cebolla<br>( <i>Allium cepa</i> )             | “Thrips”                                   | <i>Thrips tabaci</i>                         | 0.10 - 0.15    | --    | 21        | 0.1 <sup>(1)</sup><br>0.2 <sup>(2)</sup>    |
| Mandarina<br>( <i>Citrus reticulata</i> )     | “Queresa coma”                             | <i>Lepidosaphes beckii</i>                   | 0.15 - 0.20    | --    | 21        | 1 <sup>(1)</sup><br>0.2 <sup>(2)</sup>      |
| Arroz<br>( <i>Oryza sativa</i> )              | “Cigarrita del virus de<br>la hoja blanca” | <i>Tagosodes (=Sogatodes)<br/>orizixolus</i> | 0.20           | --    | 45        | 1.5 <sup>(1)</sup><br>1.0 <sup>(2)</sup>    |

PC: Periodo de Carencia

(1)Imidacloprid, (2)Lambda cyhalothrin

LMR: Límite Máximo de Residuos

