

LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.
- Usar lentes protectores y respirador cuando se manipule el producto.
- No utilice este envase para conservar alimentos o agua.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX : 0800-13040
ESSALUD : 423-7600
PINERALANDINA S.A.: 01 348-1018
- Antídotos: no hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Utilizar una banda de protección hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

GALAXY 10 CE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Alfacipermetrina..... 100 g/l
 Aditivos hasta completar un litro..... 900 g/l

Reg. PQUA N° 392- SENASA

TOTAL 1000 g/l

CONTENIDO NETO: 500 ml

Lote No.:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



TITULAR DEL REGISTRO:

Pineral Andina S.A.

Av. Flora Tristán 463 Of. 201. Urb. Santa Patricia
 II Etapa. La Molina. Lima-Perú.
 Telf.: 348-1018 Telefax : 349-9609

FABRICADO Y FORMULADO POR:
POINT INTERNATIONAL LTD



Great Rollright,
 Chipping Norton, Oxford, Ox7 5RE
 Gran Bretaña
 Telf. 4132362553

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **Pineral Andina S.A.**

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

GALAXY 10CE es un insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme. Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

USOS Y DOSIFICACIONES RECOMENDADAS:

Cultivos	Plaga		Dosis ml/200 L	Periodo de Carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre comun	Nombre tecnico			
Alfalfa	Gusano ejercito	<i>Prodenia spp.</i>	125	14	0,5
Algodón	Gusano rosado	<i>Pectinophora gossypiella</i>	125	14	0,1
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	125	14	0,1
Col	Gusano de hoja	<i>Plutella spp</i>	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	<i>Pseudoplusia spp</i>	150	14	0,05
Maiz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guías	<i>Diaphania spp</i>	125	14	0,05
Tomate	Polilla	<i>Scrobipalpus absoluta</i>	150	14	0,1

LMR= Límite máximo de Residualidad, en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN. - Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

Número máximo de aplicaciones: 4 campaña/año

PERIODO DE REINGRESO. - Como mínimo 4 horas.

COMPATIBILIDAD. - No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD. - No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. - El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

