

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Peligroso si se inhala, evita inhalar el polvo de la suspensión.
- No comer, no beber ni fumar durante la preparación de mezcla y aplicación.
- Cuando use el producto en los envases originales etiquetados o cerrados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, o drogas.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lávese las manos cuidadosamente.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Evitar el crecimiento de hongos en la superficie de la planta.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No ingerir alimentos que haya contenido plaguicidas desde el inicio para conservar alimentos o agua de consumo.

PROBLEMAS ADJUDICADOS

- Grupo químico: Triazoles.
- En caso de presentar síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente. Llame al médico al médico y manténgalo al médico.
- En caso de ingestión no inducir el vómito, sólo haga prescripción médica. Beber y enjuagar la boca con abundante agua, pero no suministrar nada más que a un paciente en estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. Continuar con agua fría, aplicar las toallas contaminadas y lavarse con abundante agua fría.
- En caso de irritación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada y mantenerlo en reposo y si fuera necesario proporcionar respiración artificial.

Nota al Médico

- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 8-800-1-3840 (gratuito)

SILVESTRE (01) 671-1330

ESALUD en línea: 991-10200 opción 4 (gratuito)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el producto, etiquete tres veces más arriba y vuelta hacia abajo en la manija de aplicación, luego recubrirlo, cerrarlo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros, campos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Realizar una prueba de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 50 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora y fauna silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en zonas de alta permeabilidad.
- En caso de siniestro, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** es un fungicida sistémico, con movimiento a través del xilema, con poder protectivo y curativo. Inhibe la germinación del hongo que vive que está ya ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.
- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** actúa sobre todas las fases del ciclo de desarrollo del hongo como la producción de esporas, la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo que invade los tejidos sanos de la planta.
- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a espalda, a motor, bombas, nebulizadores, etc. Para preparar el caldo de aspersión agite el producto antes de utilizarlo. Rene el tanque de equipo de aplicación con agua limpia hasta la mitad y añada la cantidad de producto según dosis de etiqueta, luego agite y complete con el volumen de agua a emplear, continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de myclobutanil cuando las condiciones meteorológicas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad en zonas endémicas. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Realizar 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- **SUPERBUTAXIL® 400 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en caso que exista duda. No es compatible con agentes bactericidas.

FITOTÓXICIDAD

- El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las enviadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/ctli	g/ha		
Cebollas amarillas (plantas)	"Oidiosis"	Leveillula taurica	80	-	1	2
Uva	"Oidiosis"	Uncinula necator	-	240	21	1

LMR: Límite Máximo de Residuo

P.C.: Período de Cereza



SUPERBUTAXIL® 400 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Myclobutanil..... 400 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 419 - SENASA

Contenido Neto: **100 g**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado y Envasado por:

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Lyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing, China

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**