



SUPERBU TAXIL 400 WF - NOVA CROP

Código:
Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 04-04-11
Página: 1 de 6



FUNGICIDA AGRICOLA

SUPERBUTAXIL® 400 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Myclobutanil.....	400 g/kg
Aditivos	c.s.p.1 kg

Contenido Neto: **1 Kg (2 bolsas x 500g)**



Formulado por : NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing. China

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante ocular.
- Peligroso si es inhalado, evite inhalar el polvo de la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, cortándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
***SUPERBUTAXIL® 400 WP** es un fungicida sistémico, con movimiento a través del xilema, con poder protectante y curativo. Inhibe la esporulación del hongo una vez que este ha ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.

• **SUPERBUTAXIL® 400 WP** actúa sobre todas las fases del ciclo de desarrollo del hongo como la producción de esporas, la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo que invade los tejidos sanos de la planta.

• **SUPERBUTAXIL® 400 WP** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Para preparar el caldo de aspersión agite el producto antes de utilizarlo, llene el tanque del equipo de aplicación con agua limpia hasta la mitad y añada la cantidad de producto según dosis de etiqueta, luego agite y complete con el volumen de agua a emplear, continúe agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de myclobutanil cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad en zonas endémicas. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Realizar 1 aplicación por campaña al año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

• **SUPERBUTAXIL® 400 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad en caso que exista duda. No es compatible con agentes fuertemente oxidantes.

FITOTOXICIDAD

- El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
<i>Capsicum annuum</i> (pimiento)	"Oídiois"	<i>Leveillula taurica</i>	80	1	2

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carença



3,0

Medidas en cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

L. SUPERBUTAXIL



PANTONE PROCESS BLACK C

L. SILVESTRE



PANTONE 343 C

L. SUPERBUTAXIL
B. TOXICOLÓGICA



 C 100
M 57
Y 0
K 2
PANTONE 293 C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE