

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas (usar máscara y guantes protectores).
- Usar en su envase original y almacenarlo herméticamente cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico
- Mancozeb: Alquilenbis (ditiocarbamatos)
- Benomyl: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca; y si el contacto fuese con la piel, lavarla con abundante agua y jabón.
- Si se ha ingerido el producto, provocar el vómito hasta que arroje el veneno. Se recomienda tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar al CICOTOX 0800-1-3040 (Gratuito). ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para peces

METAMAS

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Benomyl150 g/Kg
Mancozeb 640 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. N: 517-97-AG-SENASA

El titular del registro: Hortus S.A. Calle Sucre N° 270, Ate
Lima, Perú.

Formulado y Envasado por:



Zhejiang Longyou East Anasac Crop Science Co., Ltd.
Town South Donghua District, Longyou County
Zhejiang, China
Tel:+86-(0)570-7855158

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate, Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221
RU N° 141097

Contenido neto :
Lote N° :
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

v20140407

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: METAMAS es un fungicida compuesto por un ditiocarbamato y un benzimidazol que combina la acción de contacto y la sistémica. METAMAS es un fungicida de amplio espectro de acción. Su alta tecnología de fabricación y formulación lo destaca de otros fungicidas, haciéndolo más estable, más eficaz y de uso seguro. Puede ser aplicado en la desinfección de semillas para el control de la chupadera fungosa. METAMAS es absorbido por las hojas y raíces, principalmente por translocación acropétala y con acción protectora sobre el follaje.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

METAMAS no ofrece inconvenientes en la preparación de la mezcla, pero para formar una mejor suspensión conviene diluir la dosis recomendada en una pequeña cantidad de agua, luego remover la mezcla y finalmente completar el volumen de aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Enfermedades		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	%o (*)		
Trigo	Roya del tallo	Puccinia graminis	0.6 - 0.8	3 - 4	26	0.5
	Oidium	Erysiphe graminis				
Zapallo, Sandía, Melón,	Oidium	Erysiphe cichoracearum	0.6 - 0.8	3 - 4	5	2
Apio	Mancha de la hoja	Cercospora apii, Septoria apii.	0.8 - 1	4 - 5	14	0.1
Mango	Oidium	Oidium mangiferae	0.8 - 1	4 - 5	5	2
Papa	Rizoctoniasis	Rhizoctonia solani	1	5	-	-
	Remojar la semilla por 5 minutos y luego mezclar uniformemente					
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	0.25 - 0.3/qq de semilla	1.25 - 1.3	-	-
	Mezclar la semilla uniformemente					
Café	Roya del café y manchas foliares	Hemileia vastatrix Cercospora coffeicola	0.8 - 1	4 - 5	5	3
Haba	Podredumbre de flores y vainas	Botrytis cinerea	0.8 - 1	4 - 5	5	0.1
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	1	5	5	0.1

LMR= Límite máximo de residuos en ppm PC= Periodo de carencias en días o/oo: partes por mil

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION:

Puede ser aplicado en forma preventiva o cuando los primeros síntomas hayan sido detectados. Repetir las aplicaciones cada 7 o 14 días, dependiendo de las condiciones climáticas o de la presión de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas para reingresar al campo tratado, sin equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD : METAMAS es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No es compatible con productos alcalinos. En caso de aceites y concentrados emulsionables, verificar previamente la compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

