

Medidas
28.8 cm (largo) x 13 cm (alto)

4 mm

3 mm 1cm

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel: Remover la ropa contaminada, lavar la piel con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste consulte con el oftalmólogo.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito. No suministrar nada por la vía oral.
- En caso de inhalación: Mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural. Solicitar atención médica.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana S.A.: (01) 513 2500

Nota al médico:

- No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático, lavado estomacal, purgante salinos y respiración artificial.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales.

VERISMO® SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN

metaflumizone 240 g/L

Aditivos hasta completar 1L

Reg. PQUA N° 265-SENASA

BASF

The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2517 - (01) 513 2519

FORMULADO POR:
BASF CORPORATION
Agricultural Products
U.S. Highway 41 North
Sparks, GA 31647 USA

Contenido neto: 1 L

Fecha de
Formulación:

Fecha de
Vencimiento:

N° de lote:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

® Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES

VERISMO®SC es un insecticida del grupo químico de semicarbazones. Actúa como un bloqueador de canales de sodio (SCB) y no requiere de bioactivación. Como resultado, la actividad nerviosa es bloqueada causando que el insecto ingrese en un estado de parálisis causando de forma directa el cese de la alimentación, la inmovilidad y finalmente la muerte del insecto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	ml/200 L	L/ha		
Algodón	Polilla	<i>Heliothis virescens</i>	-	1.0*	21	0.05
Brócoli	Polilla	<i>Plutella xylostella</i>	500	1.0	3	0.05
Pimiento	Polilla	<i>Symmetrischema capsicum</i>	500	1.0	3	1.0
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	500	1.0	3	0.5

PC: Período de Carenia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)
*Gasto volumen de agua 500 L/Ha.
En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicación previa evaluación en el campo.
En los cultivos propuestos aplicar al inicio de infestación de la plaga con larvas que se encuentren en los primeros estadios.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: VERISMO®SC se puede mezclar con la mayoría de fungicidas, insecticidas, no es compatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado efectos tóxicos en los cultivos tratados a las dosis que se indican en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

7

3

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

3

3

ZONA DE PEGA

Pantone Azul 293 C Negro