Medidas 28.8 cm (largo) x 13 cm (alto)

3 mm 1cm

⋖

O

Ш

Ω.

Ш

 \triangleleft

 \geq

Ν

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele
- En caso de contacto con la piel: Remover la ropa contaminada, lavar la piel con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante 10 minutos. manteniendo los párpados abiertos. Si la irritación persiste consulte con el oftalmólogo.
- En caso de ingestión: No inducir el vómito. No suministrar nada por la vía oral.
- En caso de inhalación: Mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural. Solicitar atención médica.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) BASF Peruana S.A.: (01) 513 2505

Nota al médico:

 No se conoce antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático, lavado estomacal, purgante salinos y respiración artificial.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido del envase, enjuáquelo tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe reusarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estangues o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales.

VERISMO® SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Aditivos hasta completar

Reg. PQUA N° 265-SENASA

FORMULADO POR:

Agricultural Products

U.S. Highway 41 North

Sparks, GA 31647 USA

BASF CORPORATION



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR: BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao Casilla 3911. Lima 100 Telf: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2517 - (01) 513 2519

Contenido neto: 1 L

Fecha de

Formulación:

Fecha de

Vencimiento

N° de lote:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO GENERALIDADES

VERISMO®SC es un insecticida del grupo químico de semicarbazones

Actúa como un bloqueador de canales de sodio (SCBI) y no requiere de bioactivación. Como resultado, la actividad nerviosa es bloqueada causando que el insecto ingrese en un estado de parálisis causando de forma directa el cese de la alimentación, la inmovilidad y finalmente la muerte del insecto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CHADRO DE HSOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	ml/200 L	L/ha		LIVIN
Algodón	Polilla	Heliothis virescens	-	1.0*	21	0.05
Brócoli	Polilla	Plutella xylostella	500	1.0	3	0.05
Papa	Gorgojo de los andes	Premnotrypes suturicallus	500	0.6**	14	0.05
Pimiento	Polilla	Symmetrischema capsicum	500	1.0	3	1.0
Tomate	Polilla	Tuta absoluta	500	1.0	3	0.5

PC: Período de Carencia (días) *Gasto volumen de agua 500 L/Ha.

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm)

**En papa con un gasto de agua no menor a 245 L/Ha

En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicación previa evaluación en el campo.

En los cultivos propuestos aplicar al inicio de infestación de la plaga con larvas que se encuentren en los primeros estadios.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas

COMPATIBILIDAD: VERISMO®SC se puede mezclar con la mayoría de fungicidas, insecticidas, no es compatible con los plaquicidas de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado efectos tóxicos en los cultivos tratados a las dosis que se indican en el cuadro de usos.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

















LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

















Pantone Azul 293 C





[®] Marca Registrada BASF