

19 cm

19 cm

Agry-Gent Plus 800®

BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Sulfato de gentamicina	20 g/kg
Clorhidrato de oxitetraciclina.....	60 g/kg
Aditivos	c.s.p 1Kg

Reg. PQUA N° 205 - SENASA

Titular del Registro:

◆ *Sumitomo Corporation del Peru S.A.*

Contenido neto:

1 kg

Formulado por:

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO
Calle 18 N° 20501, Esquina con Innovación
Parque Industrial Impulso C.P. 31109,
Chihuahua, Chih., México.
Telefax (614) 483-9000

Lote N°:
F. Fab.:
F. Venc.:

Importado y distribuido por:

◆ *Sumitomo Corporation del Peru S.A.*

Av. José Pardo 513, Of. 701, Miraflores, Lima 18 – Perú.
Teléfono: (511) 242-7991, Fax: (511) 447-0506.

**NO
CORROSIVO**

**NO
INFLAMABLE**

**NO
EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, fumar, ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Gentamicinas y Tetraciclinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

Teléfonos de emergencia: Central de Urgencias y Emergencias de EsSalud 117 (línea gratuita), CICOTOX 0800-13040 (línea gratuita).

- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar a la persona a un lugar bien ventilado y consiga atención médica si se detecta tos u otro síntoma.
- En caso de ingestión inducir el vómito y conseguir atención médica. No inducir el vómito en una persona inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear toda las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y dépositelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CUADRO DE USOS**

Cultivo	Enfermedad		Dosis (g/cil de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Alcachofa	Putridión bacteriana	<i>Erwinia carotovora</i>	600 - 800	14	0.03

P.C. = Período de carencia en días LMR = Límite máximo de residuos en partes por millón

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGRY GENT PLUS 800 es un bactericida de uso agrícola que actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas en las bacterias fitopatógenas.

Sistema de Preparación y Aplicación

AGRY GENT PLUS 800 se aplica en pulverización manual, a motor o montada sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

AGRY GENT PLUS 800 se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña/año con 14 días de intervalo entre ellas para obtener un control eficaz.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con caldo bordalés y cualquier otro producto de fuerte reacción alcalina o extremadamente ácida. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivo recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



23 cm

3.4 cm