



FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro Nº PQUA 311 - SENASA

Contenido Neto: 1 kg

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado y Envasado por:

SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.

Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang

Province. China. Tel.: 86-574-87346015.

Fax.: 86-574-87263319

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiase y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico dicarboximida.
- En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión no inducir al vómito, sólo bajo prescripción médica. Beber y enjuagar la boca con abundante agua, pero no suministre nada vía oral a un paciente en estado inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. Si la irritación es grave, ofrecer asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavarse con abundante agua y jabón.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de utilizar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, perforándolo y dépositelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer los envases junto con residuos municipales.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

Nota al Médico

- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040

SILVESTRE (01) 617-3300

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200L	kg/ha		
Alcachofa	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.02
Cebolla	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.80	14	0.2
Mandarina	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	0.50	30	1
Manzano	"Pudrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.25	-	14	5
Palto	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
Tomate	"Pudrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	0.20	-	7	0.5
Ajo	"Podredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	0.40	-	21	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos
Volumen de agua recomendado por hectárea: 500 litros

PC: Período de Carencia.

