

Yarda®

500 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Iprodione..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p.1 kg

Registro PQUA N° 311 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado y Envasado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing
China.

Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 Kg**

F. de Form.:
N° Lote:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evite contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: dicarboximida.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD 0801-10200 o 411-8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- YARDA® 500 WP es un fungicida de contacto y preventivo desarrollado para el control de Botrytis cinerea en el cultivo de mandarina.
- YARDA® 500 WP actúa afectando la germinación de esporas y el crecimiento micelial del hongo en la planta.
- YARDA® 500 WP puede ser aplicado por aspersión foliar con cualquier equipo convencional terrestre.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda la aplicación de YARDA® 500 WP cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a un monitoreo del cultivo.
- Número máximo de aplicaciones por campaña: 1

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

YARDA® 500 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con ácidos, bases y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

YARDA® 500 WP no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	kg/ha		
AJO	"Pobredumbre blanca"	<i>Sclerotium cepivorum</i>	400	-	21	0.2
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.5	14	0.05
CEBOLLA	"Moho gris"	<i>Botrytis sp.</i>	-	0.8	14	0.20
FRESA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	750	-	7	10
MANDARINA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	0.50	30	1
MANZANO	"Podrición de las flores"	<i>Botrytis cinerea</i>	250	-	14	5
NARANJO	"Podredumbre gris/moho gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5	14	0.02
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	30	0.02
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	200	-	7	0.5
VID	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.00	5	0.45

PC: Período de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

