

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazol**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**Nota al Médico:** No existe antídoto específico.

**Teléfono de emergencia:**  
**EsSalud: 411-8000 (opción 4)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 177 - SENASA

Titular del Registro:



**Formulado por:**

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD  
Room 10-6, Shidai Square N°8, Lengjing Street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, China

**Importado y Distribuido por:**

SERFI S.A.  
Av. República de Panamá 2577,  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

Contenido Neto: 1 L

N° de lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC es un fungicida con acción sistémica.
- TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC por su actividad sistémica penetra rápidamente en los tejidos foliares afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas y cuando éstas ya son visibles.
- TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC ejerce su modo de acción inhibiendo la biosíntesis del esterol. Los esteroides son fundamentales en la estabilidad y función de las células ya que forman parte de las estructuras de la membrana celular.
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS mL/cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	100-200	15	0.05
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	100	20	0.1
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	100	14	2
Melocotonero	Oidiosis	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	120	n/d	1

PC: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Repetir la aplicación, según las condiciones climáticas.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- Usar agua limpia con pH neutro.
- Se recomienda dos aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

**COMPATIBILIDAD**

TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

TAIPAN<sup>®</sup> 25 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

