

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Nota al médico: pertenece al grupo químico de los triazoles.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0-800-1-3040
Teléfono de emergencias 24 horas: Aló Es Salud 472 2300 (Lima)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TAIPAN 25 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Tebuconazole.....	250 g/L
Aditivos	280 g/L
Solvente Nafta	c.s.p. 1 L

Reg. N° 177 - SENASA

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

Importado y Distribuido por:



Fabricado y Formulado Por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th floor, Gaoxinjishuchuangye Centre,
Shunshua Road 750, Jinan, Shandong,
China.

Titular del Registro
QUIMICA SUIZA SA
Av. República de Panamá 2577
Urb. Sta. Catalina Lima - Perú
Telf.: 211-4000

¡NO INFLAMABLE!

¡NO EXPLOSIVO!

¡NO CORROSIVO!

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **TAIPAN 25 EC** es un fungicida de amplio espectro de acción que controla eficazmente enfermedades en diversos cultivos como Cercosporiosis y oidium.
- **TAIPAN 25 EC** actúa en forma preventiva antes de que el hongo penetre a la planta; y por su actividad sistémica penetra rápidamente en los tejidos de las plantas inhibiendo el desarrollo del hongo antes de que se presenten los síntomas y cuando los síntomas son visibles.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Diluir la dosis recomendada de **TAIPAN 25 EC** en un recipiente previo con agua hasta obtener una mezcla uniforme y agregar al cilindro con agua agitando la mezcla. Usar agua limpia con pH neutro.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	100-200	15	0.05
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	100	20	0.1
Vid	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	100	14	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

La frecuencia de aplicación dependerá de que las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Y el momento de aplicación será en cualquier etapa fenológica del cultivo. Se recomienda dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD

TAIPAN 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TAIPAN 25 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

Nota al comprador: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

