

- LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO
Pertenece al grupo químico de los triazoles.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- **CICOTOX:** 0-800-1-3040
- **ALO ESSALUD:** 472-2300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
 - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TAIPAN[®] 25 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 177 - SENASA
Contenido Neto: 1 L

Importado y Distribuido por:
QUIMICA SUIZA S.A.



Fabricado y Formulado Por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia St. Ningbo 315000
China.

Titular del Registro
QUIMICA SUIZA S.A.
Av. República de Panamá 2577
Urb. Sta. Catalina Lima - Perú
Telf.: 211-4000

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

- CARACTERÍSTICAS**
- **TAIPAN 25 EC** es un fungicida con acción sistémica.
 - **TAIPAN 25 EC** por su actividad sistémica penetra rápidamente en los tejidos foliares afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas y cuando estas ya son visibles.
 - **TAIPAN 25 EC** ejerce su modo de acción inhibiendo la biosíntesis del esterol. Los esteroides son fundamentales en la estabilidad y función de las células ya que forman parte de las estructuras de la membrana celular.

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
 - Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS mL/cil 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Científico	Nombre Común			
Espárrago	<i>Cercosporiosis</i>	Cercospora asparagi	100-200	15	0,05
Mango	<i>Oidium mangiferae</i>	Oidiosis	100	20	0.1
Vid	<i>Incinula necator</i>	Oidiosis	100	14	2
Melocotonero	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	Oidiosis	120	n/d	1

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
 - Repetir la aplicación, según las condiciones climáticas.
 - Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
 - Usar agua limpia con pH neutro.
 - Se recomienda dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD
TAIPAN 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
TAIPAN 25 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

Nota al comprador: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

