LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es ligeramente irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico**: Triazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

NOTA AL MÉDICO

No existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- **CICOTOX**: 0800-1-3040
- **ALO ESSALUD**: 472-2300 (Emergencias 24 horas)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA · SEGURIDAD · TRIPLE LAVADO · AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TAIPAN® 25 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 177 - SENASA

Importado y Distribuido por:

QSI
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

Fabricado y Formulado Por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia St. Ningbo 315000
China.

Titular del Registro
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Contenido Neto: 1 L
Lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

CARACTERÍSTICAS

- **TAIPAN 25 EC** es un fungicida con acción sistémica.
- **TAIPAN 25 EC** por su actividad sistémica penetra rápidamente en los tejidos foliares afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas y cuando estas ya son visibles.
- **TAIPAN 25 EC** ejerce su modo de acción inhibiendo la biosíntesis del esterol. Los esteroles son fundamentales en la estabilidad y función de las células ya que forman parte de las estructuras de la membrana celular.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.
- Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS Cil. 200 L (mL)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Cercosporiosis	*Cercospora asparagi*	100-200	15	0.05
Mango	Oidiosis	*Oidium mangiferae*	100	20	0.1
Vid	Oidiosis	*Uncinula necator*	100	14	2

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para el desarrollo de la enfermedad.
- Repetir la aplicación, según las condiciones climáticas.
- Usar buen volumen de agua a fin de cubrir bien toda la planta.
- Usar agua limpia con pH neutro.
- Se recomienda dos aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación y sin ropa de protección adecuada.

COMPATIBILIDAD

TAIPAN 25 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

TAIPAN 25 EC no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendadas en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO