

PROYECTO DE ETIQUETA Ë Presentación 1 L

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PRECAUCIONES

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases desocupados se deberá destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS

Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

Teléfonos de emergencia:

Aló ESSALUD: 411 8000 / 0801-10200 (línea gratuita).

CICOTOX: 328-7398 / 0800-13040 (línea gratuita).

NOTA AL MEDICO

DL₅₀

- Oral aguda : > 5000 mg / Kg
- Dermal Aguda : > 2000 mg / Kg

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas+.

TRIGRR®

SUELO

(Citoquininas)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición Química:

Ingrediente activo:

Citoquininas (como kinetina)..... 0.04 g/L
Elementos minerales..... 17.40 g/L
Materiales inertes.....982.56 g/L

Reg. N°

CONTENIDO NETO

1 Litro

Titular del Registro:

FARMEX S.A.

Fabricado por:

Westbridge Agricultural Products



Formulado y distribuido por:

FARMEX S.A.

Calle Dean Valdivia N°148, Piso 7,
San Isidro, Lima-Perú.

Teléfono: 630-6400.

N° de Lote:

Fecha de Fab.:

Fecha de Venc.:

INDICACIONES DE USO:

TRIGRR® SUELO, es un regulador de crecimiento de plantas que aplicado al suelo o en el tratamiento de semillas, plántulas y esquejes, actúa como estimulante o acelerador del brotamiento si se emplea a las concentraciones y tiempos adecuado. Además, mejora la actividad microbiana del suelo dando como resultado un incremento significativo de los rendimientos.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

- Agitar fuertemente el envase de **TRIGRR® SUELO** antes de abrirlo.
- Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua luego llevarla al volumen o concentración deseada.
- La mezcla debe usarse dentro de las doce horas posteriores a su preparación.

USOS ESPECIFICOS

1.-TRATAMIENTO DE SEMILLAS, ESQUEJES Y PLANTULAS

CULTIVOS	CONCENTRACION %	TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN MINUTOS
ALGODÓN (semilla)	200 ml/qq	IMPREGNACION 5
AJO (bulbos)	1.	1-2
FRIJOL (semilla)	100 ml/25 kg	IMPREGNACION 5
CEBOLLA (plántulas)	1.0	5

2.- APLICACIÓN AL SUELO

CULTIVO	L / ha	MOMENTO DE APLICACIÓN (ALTERNATIVA)
ALGODÓN	1.5 1.0 1.0	•A la preparación del terreno. •Al momento de la siembra. •Después del desahije o al primer cultivo
AJO	1.0	•Al momento de la siembra
PAPA	1.0	•Al momento de la siembra con semillas brotada, antes de colocar la semilla.
ESPARRAGO	1.0	•Después de 10-12 días terminada la cosecha.
TOMATE	1.0	•Realizar la aplicación 15 días después del trasplante.

FORMAS DE APLICACIÓN

Las semillas deben sumergirse en la solución por el tiempo indicado, luego dejar secar y sembrar. Las plántulas deben sumergirse hasta el cuello de las mismas, impregnando las raicillas y los esquejes hasta la yema axilar más cercana al corte.

La aplicación al suelo se realiza con bomba de mochila u otros equipos de pulverización, agitando constantemente la solución. Puede hacerse en toda la superficie al momento de la preparación del terreno o en banda en el fondo de surco, al momento de la siembra.

COMPATIBILIDAD

TRIGRR SUELO puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de TRIGRR SUELO y el otro plaguicida o sustancia afín. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos.

La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.

LIGERAMENTE TOXICO
- PRECAUCION -

