

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Usar guantes y gafas protectoras durante el manejo del concentrado.
- Evitar su inhalación, ingestión y contacto con la piel.
- Almacenar el producto en un lugar sombreado, bajo techo con llave y en el envase original.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, provocar el vómito. Efectuar el lavado gástrico cuidadoso.
- En caso de emergencia llamar gratis a 0800-1-3040-CICOTOX

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No peligroso para abejas a las dosis recomendadas.
- No afecta a la fauna benéfica.
- Tóxico para peces, no contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.

TOPEXATIN 600 F

ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición :

Cihexatín.....600 g/l.
Aditivos c.s.p.....1000 cc

Reg. N° 487-97-AG-SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A., Calle Sucre N°270,
Ate-Vitarte

Contenido neto : 1 Lt
Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

Fabricado y formulado por:



AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.
Almirante Pastene 300
Teléfono: (56-2) 4706900
Santiago, Chile

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate - Vitarte
Telf.: 717-9040 / Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
R.U. N° 141097

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Topexatin 600 F es un acaricida derivado del estaño, específico para el control de formas móviles de ácaros (ninfas y adultos) que actúa por contacto e ingestión, con un marcado poder residual de hasta 21 días. En cultivos de alta cobertura y frutales usar altos volúmenes de agua para las aplicaciones (1000 a 2000 l/Ha). No mezclar con aceites emulsionables, dejar pasar entre una aplicación de aceite y Topexatin 600F o viceversa como mínimo 15 días. No se recomienda aplicar en cítricos durante el período de floración hasta fruto joven. Se recomienda no adicionar adherente.

Cuadro de Usos CONSULTA CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (Días)	LMR (*)
	N. COMUN	N. CIENTÍFICO	ml/200L	o/oo *		
Manzano	Araña roja	<i>Panonychus ulmi</i>	40 - 80	0.02 - 0.04	18	2
Limonero	Ácaro del Tostado	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	45 - 90	0.23 - 0.45	18	2
Algodonero	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	0.25 - 0.40	18	2
Alfalfa	Ácaro de dos manchas	<i>Tetranychus urticae</i>	60 - 90	0.03 - 0.45	18	0.2
Frijol	Araña roja	<i>Tetranychus spp.</i>	50 - 80	0.25 - 0.04	18	0.5
Sandía	Araña roja	<i>Paratetranychus spp.</i>	50 - 100	0.25 - 0.05	18	0.5
Fresa	Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	100 - 120	0.05 - 0.06	N.D.	0.01

* o/oo :Partes por mil

(*) LMR : Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN : TOPEXATIN 600 F tiene un efecto residual de 10 a 12 días. Su uso se recomienda tan pronto se observe el ataque de arañas (2-5 arañas/hoja). Efectuar un mojamiento completo del árbol, cuidando que las hojas se queden cubiertas por ambos lados.

PERIODO DE REINGRESO: El reingreso al área tratada puede realizarse al día siguiente de la aplicación o hasta que seque la pulverización.

COMPATIBILIDAD: Topexatin 600 F es compatible con la mayoría de insecticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina y aceites agrícolas. En caso de combinaciones no experimentadas, efectuar previamente una prueba de compatibilidad física. No aplicar con cloruro de calcio, polisulfuros o caldo bordales. Dejar pasar 15 días entre una aplicación de aceite y la de Topexatin 600F.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad cuando se usa en las dosis recomendadas. Puede ser perjudicial cuando se aplica en sobredosis o en horas de calor intenso.

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO - DAÑINO

